

# Tijekom treće desetodnevnice travnja, uvjeti će biti povoljni za povećanje infektivne pozadine brojnih gljivičnih bolesti.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 22.04.2023 Брой: 4/2023



Tijekom sljedećeg sedmodnevnog razdoblja, agrometeorološki uvjeti bit će određeni promjenjivim vremenom s čestim oborinama, što će održavati vrlo dobru razinu zaliha vlage u tlu u sloju od 50 cm i dobre uvjete za vegetaciju jesenjih sjetvi i novousijanih proljetnih usjeva. Značajne oborine koje su pale tijekom prvog i drugog desetljeća travnja u većem dijelu zemlje premašile su mjesečne norme (Vidin - 61 l/m<sup>2</sup>, Vraca - 84 l/m<sup>2</sup>, Veliko Trnovo - 74 l/m<sup>2</sup>, Razgrad - 103 l/m<sup>2</sup>, Silistra - 77 l/m<sup>2</sup>, Šumen - 86 l/m<sup>2</sup>, Dobrič - 80 l/m<sup>2</sup>, Haskovo - 77 l/m<sup>2</sup>, Kardžali - 60 l/m<sup>2</sup>, Elhovo - 91 l/m<sup>2</sup>, Stara Zagora - 77 l/m<sup>2</sup>, Karnobat - 68 l/m<sup>2</sup>) i poboljšale zalihe vlage i u

dubljim slojevima tla. Krajem drugog desetljeća u većini poljoprivrednih područja, zalihe vlage u tlu u sloju od 50 cm za ozime žitarice dosegle su razine iznad 80–85% poljskog vodnog kapaciteta.

Većinu dana nadolazećeg razdoblja razvoj poljoprivrednih kultura odvijat će se umjerenom brzinom, pri temperaturama blizu, a krajem razdoblja nešto ispod klimatskih normi. Tijekom razdoblja, pšenica će uglavnom biti u fazi izdizanja stabiljke, a kod ječma, na pojedinim mjestima u Podunavskoj nizini (agrometeorološka postaja Novachene), uočiti će se i početak klasanja. Ozima uljana repica bit će uglavnom u fazi cvatnje. U sjetvama suncokreta i kukuruza, ovisno o rokovima sjetve, uočiti će se nicanje i formiranje listova.

U središnjoj sjevernoj i sjeverozapadnoj Bugarskoj, opet zbog dugotrajnih kiša i nepovoljnih klimatskih uvjeta, odgađa se sjetva. Proizvođači su osigurali potrebno sjeme, površine su pripremljene i, pod povoljnim uvjetima, poljoprivrednici su spremni sjeti pri prvoj prilici. Do sada zasijane površine vrlo su male u usporedbi s istim razdobljem prethodnih godina.

Predviđene česte oborine tijekom trećeg desetljeća travnja stvorit će uvjete za povećanje infektivnog pritiska brojnih gljivičnih bolesti: septoriozne pegavosti listova i rđe listova na ozimim žitaricama; na voćkama – plamenjače cvjetova (rana smeđa trulež), rupičavost lišća, kovrčavost lišća breskve, pepelnice, što zahtijeva, pri prvoj prilici nakon prestanka oborina, pravovremenu primjenu mjera zaštite bilja.

*Izvor: NIMH*