

Česta oborina i nestabilno vrijeme tijekom druge polovice svibnja

Автор(и): Растителна заштита
Дата: 20.05.2023 Брой: 5/2023



Tijekom nadolazećeg razdoblja agrometeorološke će uvjete ponovno određivati nestabilno vrijeme, s čestim oborinama, što će održavati dobre rezerve vlage u sloju tla od 50 i 100 cm.

U većini dijelova zemlje, s izuzetkom nekih lokacija u istočnim regijama (Čirpan, D. Čiflik, Karnobat), rezerve vlage u tlu u jednometarskom sloju za jesensko posijane usjeve iznad su 80% poljskog vodnog kapaciteta (PVK).

Tijekom razdoblja, razvoj poljoprivrednih kultura odvijat će se umjerenim tempom, pri srednjim dnevnim temperaturama blizu klimatskih normi za drugu polovicu svibnja. Do sredine treće dekade, na poljskim

površinama, ozime žitarice bit će u fazi formiranja i nalijevanja zrna. Krajem razdoblja, kod ječma na nekim lokacijama u južnim regijama (Sandanski, Karnobat) također će se uočiti početak faze mliječne zrelosti.

Kod suncokreta i kukuruza bit će u tijeku formiranje listova.

Kod vinove loze prevladavat će faza izbijanja cvasti. Ova fenofaza je kritična za infekciju vinove loze peronosporom (*Plasmopara viticola*) i pepelnicom (*Uncinula necator*).

Predviđene oborine tijekom razdoblja održavat će povoljne uvjete za razvoj gljivičnih bolesti: rđe, septorioze i fuzarioze klasa kod pšenice; peronospore na povrtnim kulturama i vinovoj lozi; kasne smeđe truleži na plodovima ranih sorti trešanja.

Krajem svibnja, štetu na srednje ranim sortama trešanja uzrokuje trešanjeva muha. Kako bi se smanjila šteta od ovog opasnog štetnika, preporuča se da se na početku faze zrenja, pri prvoj prilici nakon prestanka oborina, izvrši tretman insekticidima s kratkim rokom čekanja do berbe.

Izvor: DHMZ