

Povećana vjerojatnost tuča i visok infekcijski pritisak gljivičnih patogena u poljoprivrednim usjevima u lipnju

Автор(и): Растителна защита

Дата: 06.06.2023 Брой: 6/2023



Tijekom prve dekade lipnja, agrometeorološke uvjete odredit će nestabilno i za sezonu hladno vrijeme.

Predviđene oborine tijekom dekade održavat će visoku razinu zaliha vlage u tlu u slojevima od 50 cm i 100 cm – na većini poljskih površina iznad 80–85% poljskog vodnog kapaciteta (PVK). Prisutnost vrlo dobrih zaliha vlage u tlu početkom lipnja imat će povoljan učinak na ozime žitarice, u kojima će u usjevima u južnim i jugoistočnim regijama zemlje teći punjenje zrna, formiranje zrna i faza mliječne zrelosti. Tijekom međufaznog razdoblja punjenja zrna – mliječne zrelosti, štetu na pšenici uzrokuju ličinke štitastog smradaša, što zahtijeva terenski pregled usjeva i, kada gustoća štetočine prijede prag ekonomske štete (2 ličinke/m²), pravovremenu obradu.

Nakon hladnog vremena na početku druge dekade, predviđa se porast temperatura i ubrzanje razvojnih faza poljoprivrednih kultura. Do sredine lipnja, na većini poljskih površina, ječam će dostići fazu voskovne zrelosti.

Tijekom većine dana u drugoj polovici lipnja, razvoj poljoprivrednih kultura odvijat će se pri temperaturama bliskim klimatskim normama. Početkom treće dekade, pšenica će uglavnom biti u fazi zrenja.

Do kraja mjeseca, dio jarih usjeva ući će u reproduktivne faze razvoja: kod suncokreta će se uočiti početak cvatnje, a kod ranih hibrida kukuruza – metličanje i cvatnje metlice.

Meteorološki uvjeti u lipnju održavat će povišeni infektivni fond gljivičnih patogena: plamenjače na povrtnim kulturama, kasna smeđa trulež na kasnijim sortama trešanja, pepelnica i pepeljuga na voćnim drvećima. Kod vinove loze, međufazno razdoblje od cvatnje cvasti do zametka bobice veličine graška kritično je za infekciju plamenjačom.

Tijekom mjeseca, povoljniji uvjeti za provođenje tretmana zaštite bilja javit će se u prvoj polovici druge i tijekom većine dana treće dekade.

U lipnju će vjerojatnost tuča ostati povišena. Nakon tuče, pogođene voćne i povrtna kulture treba obraditi pri prvoj prilici (po mogućnosti unutar 48 sati nakon pojave) fungicidima na bazi bakra.

Izvor: DHMZ