

U voćnjaku u srpnju

Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.07.2023 Брой: 7/2023



U srpnju se u **jabučnjacima** gdje nije došlo do infekcije krastavosti, prekida s prskanjem protiv ove bolesti. U prisutnosti infekcije na listovima i plodovima te uz česte pljuskove, rizik od kasnih infekcija i povećanja stupnja oštećenja ploda i dalje postoji, što u tom slučaju zahtijeva tretmane čak i tijekom ovog razdoblja.

Za sorte jabuka koje su osjetljive na pepelnicu, prskanje protiv ove bolesti također se nastavlja. Za istovremenu kontrolu obje bolesti koristi se jedan od sljedećih fungicida: Bellis – 80 g/da, Sulgran – 750 g/da i Kumulus – 600–900 g/da protiv pepelnice, te Chorus 50 WG – 0.03%, Difcor 250 EC – 15 ml/da, Koprations Duo – 300 g/da, Scab – 300 ml/da i Captan 80 WG – 150–180 g/da protiv krastavosti. Za istovremenu kontrolu obje bolesti prikladni su sljedeći: Flint Max 75 WG – 0.02%, Score 250 EC – 0.02%, Luna Experience – 20–75 ml/da, Thiovit Jet 80 WG – 600 g/da, Revyona – 200 ml/da.

Kako bi se spriječila pojava rezistencije gljivice koja uzrokuje krastavost (*Venturia inaequalis*), najbolje je izmjenjivati proizvode s različitim načinima djelovanja na patogen ili koristiti mješavine fungicida za njezinu kontrolu.

Sorte otporne na krastavost – Prima, COOP-10, Frolina, Liberty, Jonafree, Jonathan, Pioneer, McFree, Pilot, Topaz, Novamak, Sava, Rubinola, itd., prskaju se samo protiv pepelnice.

Za **krušku** se mora nastaviti s prskanjem protiv krastavosti te bijelih i smeđih pjegavosti lista. Za kontrolu ovih bolesti koristi se jedan od sljedećih fungicida: Difcor 250 EC – 15 ml/da, Luna Experience – 20–75 ml/da, Captan 80 WG – 150–180 g/da, Thiovit Jet 80 WG – 600 g/da.

Za **šljivu** se u srpnju prskanje usmjerava protiv smeđe truleži i rđe. Protiv smeđe truleži prskanje se provodi s jednim od sljedećih fungicida: Difcor 250 EC – 20 ml/da, Captan 80 WG – 150–180 g/da, Chorus 50 WG – 0.045%, Geoxe – 40–60 g/da. Protiv rđe odobren je Signum WG – 45 g/da, koji je također učinkovit protiv smeđe truleži.

Početkom srpnja plodovi ranih sorti **breskve** počinju sazrijevati i tijekom tog razdoblja ne prskaju se. Za **kasne sorte breskve** nastavlja se kontrola pepelnice, suhe pjegavosti i smeđe truleži. Protiv pepelnice koristi se jedan od sljedećih fungicida: Score 250 EC – 0.02%, Luna Experience – 50 ml/da, Topaz 100 EC – 0.03%, Thiovit Jet 80 WG – 600 g/da. Za kontrolu smeđe truleži prskanje se provodi s Delan 700 WDG – 0.05%, Chorus 50 WG – 0.045% ili Luna Experience – 63–75 ml/da.



U srpnju kajsije sazrijevaju i ne prskaju se.

Za **malinu** se tijekom ovog razdoblja ne provodi prskanje, s izuzetkom **remontantnih sorti** kao što je Lyulin. Za njih su potrebni tretmani protiv didimele i antraknoze. Koristi se jedan od sljedećih fungicida: Signum WG – 100 g/da i Funguran OH 50 WP – 0.15%. Uz česte pljuskove i visoku vlažnost zraka, potrebno je i prskanje protiv sive plijesni. Koristi se Switch 62.5 – 100 g/da.

Nakon berbe, listovi **zasada jagoda** pokose se, uklone s plantaže i unište spaljivanjem ili zakopaju kako bi se razgradili.