

Krajem srpnja i početkom kolovoza – razvoj poljoprivrednih usjeva odvijat će se pri temperaturama bliskim klimatskim normama i uz manjak vlage u tlu.

*Автор(и): Растителна защита
Дата: 28.07.2023 Брой: 7/2023*



Vruće vrijeme tijekom većine dana treće dekade srpnja, s iznimno visokim maksimalnim temperaturama do i iznad 40-42°C, poremetilo je normalan tijek vegetacijskih procesa u poljoprivrednim usjevima. Ove vrijednosti uzrokovale su toplinski stres i sparušivanje listova u dijelu kasnih proljetnih usjeva, te prerano opadanje listova u voćnim stabljima. (Na agrometeorološkoj postaji u Silistri uočeno je prerano žutilo listova u 50% sastojina kukuruza uzgojenih u ne navodnjavanim uvjetima).

Nakon kratkog, ali značajnog hlađenja na kraju proteklog sedmodnevnog razdoblja, tijekom posljednjih dana srpnja i početkom kolovoza razvoj poljoprivrednih usjeva odvijat će se pri temperaturama bliskim klimatskim normama i u uvjetima manjka vlage u tlu. Oborine krajem srpnja bile su lokalnog karaktera i u većini dijelova zemlje, s izuzetkom pojedinih lokacija u sjeverozapadnim (N. Selo, Lom, Kneža, Pleven) i jugoistočnim regijama (Sliven, Karnobat, Burgas), bile su beznačajne, ispod 10 l/m². Tijekom sljedećeg razdoblja ne predviđaju se oborine agronomskog značaja, te primjena odgovarajućeg režima navodnjavanja ostaje prioritarna mjera za kasne poljoprivredne usjeve. Početkom kolovoza, rani hibridi kukuruza ući će u fazu voštane zrelosti, kod srednje ranih hibrida uočiti će se mliječna zrelost, a kod kasnijih hibrida kukuruza odvijat će se formiranje i nalijevanje zrna. U suncokretu, u dijelovima Podunavske nizine i u južnim regijama, odvijat će se faza zrenja.

Krajem srpnja i početkom kolovoza, tretmane za zaštitu bilja treba provoditi tijekom hladnijih sati, koristeći proizvode s prikladnim prethodnim razdobljem prije berbe, u skladu s razdobljem zrenja usjeva. U voćnjacima, suzbijanje druge generacije voćnih moljaca ne treba podcjenjivati. Povrtne kulture pogođene tučom koji se dogodio na kraju proteklog razdoblja preporuča se tretirati fungicidima koji sadrže bakar.

Izvor: DHMZ