

Rujan – povoljni uvjeti za formiranje dodatnog prinosa od kasnih povrtnih kultura

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.09.2023 Брой: 9/2023



U većini dana prve dekade rujna predviđeni su iznadprosječni toplinski uvjeti, što će ubrzati završne faze razvoja kasnih poljoprivrednih kultura. Tijekom tog razdoblja, srednje kasni hibridi kukuruza bit će u fazi voštane i potpune zrelosti, dok će kasni hibridi biti u fazi mliječne zrelosti i prijelaza u voštanu zrelost.

Početak druge dekade, agrometeorološki uvjeti će se promijeniti. Do sredine treće dekade, oni će biti određeni nestabilnim vremenom i temperaturama blizu klimatskih normi. Tijekom tog razdoblja predviđaju se oborine od gospodarskog značaja, koje će nakon produbljene suše poboljšati uvjete za obavljanje predviđene obrade površina namijenjenih sjetvi jesenskih usjeva. Do kraja druge dekade rujna je optimalno agrotehničko vrijeme za sjetvu ozimog uljane repice.

Tijekom druge dekade, kasni hibridi kukuruza također će završiti svoj razvoj, a riža će biti u fazi voštane i potpune zrelosti. Predviđene česte oborine tijekom druge i prve polovice treće dekade povećat će rizik od razvoja patogena koji uzrokuju trulež zrelog voća i povrtne proizvodnje – sive plijesni na grožđu (*Botrytis cinerea*), kasne smeđe truleži (*Monilinia fructigena*) na plodovima jesensko-zimskih sorti voćaka, plamenjače krumpira (*Phytophthora infestans*) na rajčicama iz kasne proizvodnje, itd.

U drugoj polovici treće dekade očekuju se suho vrijeme i povoljni uvjeti za berbu grožđa. Kao rezultat iznadprosječnih ljetnih temperatura, dio kasnijih sorti vinskog grožđa postići će tehnološku zrelost ranije od uobičajenih rokova.

Krajem rujna, preporučljivo je pregledati nasade krušaka na prisutnost opasnog štetnika – pupoljkaša kruške. Suzbijanje ovog štetnika učinkovito je samo protiv odraslih jedinki početkom jeseni. Ako gustoća štetnika premašuje razinu ekonomske štete (3 jedinice po stablu), potreban je tretman.

U rujnu se ne predviđaju kritične minimalne temperature, a uvjeti će omogućiti stvaranje dodatne proizvodnje od kasnih povrtnih kultura osjetljivih na mraz.

Izvor: DHMZ