

Listopad – optimalni uvjeti za sjetvu ozimih žitarica i dodatna proizvodnja od povrtnih kultura te kasnih sorti voćaka i vinove loze

Автор(и): Растителна заштита

Дата: 01.10.2023 Брой: 10/2023



U listopadu će agrometeorološke uvjete određivati temperature oko i iznad klimatskih normi te oborine oko i ispod mjesečnih normi.

Početak listopada predviđene temperature iznad normale, s maksimalnim vrijednostima do 30-32°C, ubrzat će procese zrenja kod kasnih sorti voćaka i vinove loze te će stvoriti uvjete za branje dodatnog prinosa od povrtnih kultura kasne poljske proizvodnje (rajčice, paprike, tikvice, krastavci). Kao rezultat toplinskih uvjeta iznad

normale, kasne sorte crnog vinskog grožđa postići će tehnološku zrelost ranije od uobičajenih rokova, a jesenske sorte voćaka postići će zrelost za branje.

Nakon relativno suhog i toplog za godišnje doba vremena tijekom druge polovice prvog desetljeća, agrometeorološki uvjeti će se promijeniti. Tijekom tog razdoblja predviđa se značajan pad minimalnih temperatura, s uvjetima za stvaranje mraza u kotlinama i na višim poljima, što će zahtijevati pravovremenu berbu povrtnih kultura osjetljivih na oštećenja od mraza (rajčice, paprike).

Krajem prvog i početkom drugog desetljeća očekuju se oborine od gospodarskog značaja, poboljšanje zaliha vlage u tlu u gornjim slojevima tla i poboljšanje uvjeta za provođenje sezonske obrade tla. Suša krajem ljeta i početkom jeseni u mnogim dijelovima zemlje, s izuzetkom jugoistočnih regija, odgodila je predviđenu obradu površina namijenjenih sjetvi jesenskih usjeva. Iz tog razloga, u velikom dijelu poljoprivrednih regija propušteni su agrotehnički rokovi u rujnu za sjetvu ozimog uljane repice.



Listopad je optimalno razdoblje za sjetvu ozimih žitarica. Tijekom prvog desetljeća je agrotehnički rok za sjetvu pšenice u Sjevernoj Hrvatskoj, od 15. do 25. listopada u Južnoj Hrvatskoj, a krajem mjeseca – duž obale Jadranskog mora.

Većinu dana u drugoj polovici listopada početne faze vegetacije posijanih jesenskih usjeva odvijat će se u toplinskim uvjetima iznad normale. Sredinom i krajem trećeg desetljeća postoji predviđena vjerojatnost oborina,

poboljšanja zaliha vlage u tlu u sloju tla od 50 cm i poboljšanja uvjeta za razvoj ozimih žitarica. Krajem listopada, kod pšenice, ovisno o rokovima sjetve, uočit će se sljedeće faze: nicanje i formiranje listova (1-3 lista).

Predviđeni toplinski uvjeti u listopadu, oko i iznad norme, preduvjet su za povećanje populacije obične voluharice – jednog od opasnih štetnika u jesenskim usjevima. Krajem mjeseca potrebno je pregledati jesenske usjeve na prisutnost štetnika, a tamo gdje njegova gustoća prelazi prag ekonomske štete (2 aktivne kolonije po hektaru), potrebne su pravovremene mjere zaštite bilja (otrovne mamce postavljene na ulaze u kolonije).

U nasadima jabuka i krušaka, na početku opadanja lišća, nakon berbe ploda, preporuča se prskanje stabala s 5%-tnom otopinom uree. Ovaj tretman ograničava infekciju čađavosti.

Za koštuničavo voće, protiv bakterijske raka, kovrčavosti lišća breskve, rupičavosti lišća i rane smeđe truleži kod marelica, trešanja i višanja, nakon masovnog opadanja lišća, potrebno je izvršiti prskanje s 2%-tnom bordolačom smjesom.

Izvor: DHMZ