

Tijekom druge polovice listopada, očekuje se poboljšanje hidrofizičkog stanja gornjeg sloja tla.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 16.10.2023 Брой: 10/2023



Nedostatak oborina tijekom prvog i početka drugog desetljeća listopada doveo je do produbljivanja postojeće suše. U većini ratarskih područja zemlje nema produktivne vlage u sloju tla od 50 cm, a u pojedinim područjima jugozapadne Bugarske (agrometeorološka postaja Kyustendil) – u cijelom jednometarskom sloju.

Nakon predviđenog suhog i sezonski toplog vremena do sredine listopada, tijekom druge polovice drugog desetljeća agrometeorološki uvjeti će se promijeniti. Tijekom tog razdoblja očekuju se rasprostranjene oborine, na pojedinim mjestima do $15-20 \text{ l/m}^2$, poboljšanje vodenofizičkog stanja gornjeg sloja tla i uvjeta za obavljanje odgođene predviđene obrade površina predviđenih za sjetvu ozimih kultura. Zbog suše, na mnogim mjestima u ratarskim područjima propušteni su agrotehnički rokovi u rujnu za sjetvu ozime uljane repice. Također se

očekuju kašnjenja u sjetvi ozimih žitarica. Sredinom listopada ističu optimalni rokovi za sjetvu pšenice u sjevernoj Bugarskoj. U sljedećem razdoblju počinju agrotehnički rokovi za sjetvu ozimih žitarica u južnim regijama zemlje.



Suša u Dobrudži otežava pripremu površina za jesensku sjetvu pšenice. Optimalni rokovi za postavljanje sjemena novog usjeva su do kraja listopada, prema znanstvenicima iz Poljoprivrednog instituta Dobrudža – General Toshevo.

Razdoblje sjetve uvelike ovisi o klimatskim uvjetima. Posljednjih godina nije neuobičajeno da se sjetvena kampanja nastavi u studenom. Istodobno, stanje usjeva uvelike ovisi o tome kakve će temperature i oborine biti u studenom i prosincu te u kojoj će se mjeri biljke očvrnuti kako bi prezimile.

Predviđene oborine tijekom druge polovice sljedećeg razdoblja očekuje se da će osigurati potrebnu vlagu za početne faze vegetacije jesenskih usjeva. Krajem drugog desetljeća listopada, u posijanim ozimim žitaricama (agrometeorološka postaja Targovishte) bit će u tijeku faza klijanja i početnog formiranja listova.

Povoljni uvjeti za završetak berbe grožđa i za branje jesenskih sorti voća pojavit će se na početku i na kraju razdoblja.

Izvor NIMH