

Nova ponuda od FMC-a za izvrsnu kontrolu plamenjače

Автор(и): ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ

Дата: 27.11.2023 Брой: 11/2023



Отличен контрол срещу мана

Ove godine, uz svoj opsežni portfelj proizvoda za zaštitu bilja, gnojiva, aminokiseline i biostimulatore, u segmentu fungicida FMC je registrirao novi fungicid za zaštitu krumpira, rajčice i vinograda od plamenjače – Cantico. Cantico je fungicid izvrsnog djelovanja protiv gljivičnih patogena iz razreda *Oomycetes*, posebno protiv plamenjače krumpira i peronospore vinove loze. Fungicid ima snažno zaštitno djelovanje kada se primjenjuje preventivno. Cantico se mora primijeniti prije infekcije patogenom. Za učinkovitu kontrolu – u razdoblju od 5 do 12 dana ovisno o usjevu – najbolje je da se tretmani prilagode stupnju zaraze patogenom.

Ciazofamid je posebno razvijena aktivna tvar s lokalno-sistemske djelovanjem, koja se slobodno kreće unutar biljke, što omogućuje njezinu primjenu u ranim fazama rasta. Silicij sadržan u formulaciji Cantico izvrsno

pomaže u prevladavanju površinske napetosti maksimizirajući kontakt između fungicida i tretirane površine biljke.

Način djelovanja Cantico temelji se na ometanju disanja, budući da ciazofamid inhibira mitohondrijsko disanje. Cantico inhibira sve faze životnog ciklusa patogena (zoospore, micelij, sporulacija), ne vršeći štetni učinak na prirodne kvasce na grozdovima i na fermentaciju vina.

Ciazofamid ne pokazuje unakrsnu rezistenciju s aktivnim tvarima klasificiranim kao vanjski inhibitori, koji djeluju na vanjsku membranu mitohondrija (na primjer: azoksistrobin, piraklostrobin, kresoksim-metil, famoksadon).

Cantico nudi visok stupanj prijanjanja na voštane prevlake i otpornost na ispiranje kišom, čime se održava visoka razina učinkovitosti čak i nakon intenzivnih padalina (40, 60, 100 mm kiše) neposredno nakon primjene.

Formuliran s visokim stupnjem micronizacije, pogodan za pripremu suspenzija i jednostavan za primjenu, ne sadrži otapala i kompatibilan je s mnogim komercijalnim proizvodima komplementarne aktivnosti.

Izvrсна zaštita tijekom vegetacije i zrenja kada se primjenjuje preventivno i kada se poštuju doze i intervali tretmana.