

Siječanj počinje neuobičajeno visokim temperaturama

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.01.2024 Брой: 1/2024



Klimatske anomalije s početka zime, s neuobičajeno visokim temperaturama preko 20–21°C na mnogim mjestima, dovele su do ponovnog pokretanja vegetacijskih procesa u jesenskim usjevima u dijelovima obradivih regija u zemlji. Neobično toplo vrijeme uzrokovalo je, u nekim od krajnjih jugozapadnih regija, prerano i nepoželjno bubrenje pupova kod određenih ranocvatućih grmastih i voćnih vrsta kao što su drenjina, marelica, breskva i trešnja.

Početkom siječnja agrometeorološki uvjeti i dalje će biti određeni iznadprosječnim temperaturama i prosječnim dnevnim vrijednostima u ratarskim regijama iznad biološkog minimuma potrebnog za pojavu odgođene vegetacije u ozimih žitarica.

Tijekom druge polovice prvog desetljeća predviđa se pad temperatura i promjena agrometeoroloških uvjeta. Očekivano hlađenje tijekom tog razdoblja prekinut će kasnu vegetaciju ozimih žitarica i ometat će nepravodobni razvoj nekih vrsta drveća, što bi inače dovelo do smanjenja njihove otpornosti na zimu. Tijekom drugog i trećeg desetljeća agrometeorološki uvjeti bit će određeni temperaturama bliskim klimatskim normama, što će održati ozime žitarice u stanju mirovanja.

U siječnju će sjetve pšenice i ječma prezimiti u različitim fenološkim fazama. Kasno posijane ozime žitarice krajem jeseni, na agrometeorološkim postajama Băzovec, Nikolaevo, Kazanlăk, Sliven i Chirpan, nalaze se u fazi nicanja i početnoj fazi formiranja listova. U sjetvama iz studenog u Kneži, Tărgovištu, Pazardžiku, Haskovu i Ljubimcu prevladava faza trećeg lista. Mali dio sjetvi pšenice i ječma na nekim mjestima u Dunavskoj nizini – agrometeorološka postaja Novachene – i u Gornjotračkoj nizini u regiji Plovdiv nalazi se u fazi busanja, što je prikladna faza za prezimljavanje. U siječnju predviđene minimalne temperature, do minus 13°C, neće predstavljati rizik za trajne nasade i za ozime žitarice koje su ušle u fazu busanja. U uvjetima bez snježnog pokrivača, vrijednosti u rasponu od minus 10–13°C, ako potraju dulje vrijeme, bit će kritične za kasno posijane, slabo uspostavljene sjetve. Predviđene oborine u siječnju, oko i iznad norme, povećat će zalihe vlage u tlu u jednodimetarskom i dvodimetarskom sloju tla. Krajem prosinca, zalihe vlage u tlu za pšenicu u jednodimetarskom sloju u većini ratarskih regija bile su iznad 85–90% poljskog vodnog kapaciteta (PVK).

Tijekom mjeseca, povoljniji uvjeti za zimsko rezidbu jabučastog voća pojavit će se početkom prvog i tijekom većine dana trećeg desetljeća.

Izvor: NIMH