

Veljača – agrometeorološki uvjeti s povećanom dinamikom

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.02.2024 Брой: 2/2024



U veljači će agrometeorološki uvjeti biti vrlo dinamični, s izmjenjivanjem razdoblja iznadnormalnih temperatura i vrijednostima na razini klimatskih normi za mjesec te ispod njih.

Tijekom većine dana prvog desetljeća, agrometeorološke uvjete odredit će temperature visoke za sezonu. Predviđene prosječne dnevne vrijednosti u ratarskim regijama zemlje dosegnut će i premašiti biološki minimum potreban za ponovno pokretanje vegetativnih procesa u ozimim žitaricama. Predviđene temperature, visoke za sezonu tijekom druge polovice prvog desetljeća veljače, s maksimalnim vrijednostima u rasponu od 15-20°C, potaknut će prerani razvoj kod nekih ranocvjetnih koštičavih vrsta voćaka (badem, marelica, breskva) u južnim i jugoistočnim regijama zemlje.

Krajem prvog i početkom drugog desetljeća, agrometeorološki uvjeti će se promijeniti. Očekivani hladni val će inhibirati vegetaciju jesenje sjetve i prerani, nepoželjni razvoj voćaka.

Tijekom druge polovice veljače, predviđene prosječne dnevne temperature u većem dijelu zemlje bit će unutar raspona koji će kočiti razvoj poljoprivrednih kultura koje prezimljavaju. Iznimke će se primijetiti u krajnje južnim i jugoistočnim regijama, gdje će krajem mjeseca biti stvoreni uvjeti za početak odgođene vegetacije u jesenje sjetim usjevima, ali značajna promjena u fenološkim fazama usjeva se ne očekuje. Krajem veljače prevladavat će usjevi pšenice u fazi rasta trećeg lista.

Tijekom mjeseca, predviđene minimalne temperature, do minus 12°C, iznad su kritičnih pragova za usjeve pšenice koji prezimljavaju u fazi trećeg lista i busanja. U uvjetima bez snježnog pokrivača i uz dulje zadržavanje, ove vrijednosti predstavljat će rizik za kasno sjetu ozimu žitaricu koja je u početnoj fazi formiranja listova (1-2 lista).

Očekivane oborine u veljači, oko i iznad norme, povećat će rezerve jesensko-zimske vlage u tlu također u dvometarskom sloju tla. Krajem drugog desetljeća siječnja, rezerve vlage u tlu za pšenicu u jednometarskom sloju u većem dijelu zemlje, s izuzetkom nekih lokacija u istočnim regijama (Razgrad, D. Chiflik, Chirpan, Sliven), bile su na razinama iznad 90% poljskog vodnog kapaciteta.



Tijekom mjeseca, povoljniji uvjeti za obavljanje sezonskih agrotehničkih radova — rezidbe u vinogradima i voćnjacima, zimskog prskanja voćaka fungicidima na bazi bakra, gnojidbe jesenje sjetve dušičnim mineralnim gnojivima, predsjetvene obrade površina namijenjenih sjetvi ranih jarih usjeva (grašak, grahorica, zob, jari ječam) — javit će se većinom dana prvog desetljeća i u drugoj polovici drugog desetljeća.



U veljači je potrebno nadzirati polja pšenice na prisutnost opasnog štetnika — poljske voluharice, a tamo gdje njezina gustoća premašuje ekonomski prag štetnosti (ETH — 1 aktivna kolonija po dekaru), imperativ su pravovremene mjere zaštite bilja rodenticidima odobrenim za tu namjenu.

izvor DHMZ