

Krajem veljače – pogodni uvjeti za obradu tla polja namijenjenih sjetvi proljetnih usjeva, rezidbu i zaštitno prskanje u trajnim nasadima.

Автор(и): Растителна заштита

Дата: 26.02.2024 Брой: 2/2024



Krajem veljače, agrometeorološki uvjeti i dalje će biti određeni prosječnim dnevnim temperaturama iznad biološkog minimuma potrebnog za nastavak i napredovanje vegetativnih procesa u ozimim žitaricama. Na kraju jesensko-zimskog razdoblja akumulacije vlage, zalihe vlage u tlu na obradivim površinama u jednometarskom sloju kreću se od 70% do 90% poljskog vodnog kapaciteta (PVK).

Tijekom tog razdoblja, u kasno posijanim sastojinama pšenice i ječma koje zaostaju u razvoju, promatrat će se faza razvoja trećeg lista. Faza busanja promatrat će se u sastojinama u Dunavskoj nizini te na pojedinačnim

lokacijama u južnim regijama zemlje – agrometeorološke postaje Băzovec, Knezha, Novachene, Nikolaevo, Dolni Chiflik, Targovishte, Silistra, Lyubimets, Plovdiv, Pazardzhik, Kyustendil i Sandanski. Kod koštičavog voća dogodit će se bubrenje pupova.

Žitna hrđa – *Zabrus tenebrioides*

Tijekom većine dana u razdoblju, s izuzetkom nekih mjesta u zapadnim regijama gdje se predviđaju oborine, uvjeti će biti pogodni za: obradu tla na poljima namijenjenim sjetvi jarih usjeva; rezidbu i prskanje za zaštitu bilja u trajnim nasadima; pregled sastojina pšenice i ječma na prisutnost i štetno djelovanje poljske voluharice i ličinki žitne hrđe. S obzirom na nastavak vegetacije u ozimim žitaricama, prednost treba dati dovršetku dušične gnojidbe sastojina.

Izvor: NIMH