

Iznadprosječne temperature početkom ožujka osigurat će aktivan napredak vegetativnih procesa u poljoprivrednim usjevima.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 04.03.2024 Брой: 3/2024



Iznadprosječne prosječne dnevne temperature i zabilježene neobično visoke maksimalne vrijednosti oko i iznad 20°C, dosežući na nekim mjestima 23°-24°C (Vidin, Montana, Knezha, Lovech, Veliko Tarnovo, Ruse, Plovdiv, Pazardzhik, Stara Zagora, Haskovo, Elhovo, Sliven) u veljači dovele su do ponovnog pokretanja vegetacijskih procesa u jesenskim usjevima i do preranog razvoja i bubrenja pupova u koštičavog voća i nekih jabučastih vrsta – jabuka, agrometeorološke postaje Nikolaevo i Novachene. Ispodprosječne količine oborina tijekom mjeseca nisu omogućile postizanje potpunog zasićenja u jednometarskom sloju tla (poljski vodni kapacitet) u nekim područjima sjeverne središnje i istočne Bugarske te na pojedinačnim lokacijama Gornjotrakijske nizine.

Tijekom prvih dana prve dekade ožujka predviđaju se temperature iznad klimatskih normi i uvjeti za tijek vegetacije u poljoprivrednim usjevima. Do kraja razdoblja očekuje se pad temperatura na vrijednosti blizu klimatskih normi, blizu biološkog minimuma potrebnog za tijek vegetativnih procesa u ozimih žitarica.

Tijekom razdoblja, vegetativni procesi u ozimim žitaricama odvijat će se usporenim tempom pri prosječnim dnevnim temperaturama blizu klimatskih normi za prvu dekadu mjeseca. U pšenice i ječma odvijat će se faza busanja – početno i puno busanje. U koštičavog voća, u najnaprednijih stabala dogodit će se faze pucanja pupova, zeleni cvasti i početak cvatnje. U jabučastog voća uočit će se bubrenje pupova. U vinove loze dogodit će se tijekom soka – agrometeorološka postaja Bazovets. Tijekom razdoblja ne predviđaju se kritične minimalne temperature za rano razvijene vrste koštičavog voća.

Česte oborine tijekom razdoblja ograničit će mogućnosti za provođenje sezonskih agrotehničkih aktivnosti – obavljanje predsetvene obrade tla na površinama namijenjenim sjetvi suncokreta, završetak prihrane jesenskih usjeva dušičnim gnojivima, završetak rezidbe u voćnjacima i vinogradima te provođenje predcvatnih tretmana u voćaka.

Tijekom druge i treće dekade ožujka, agrometeorološki uvjeti bit će određeni dinamičnim vremenskim prilikama. Predviđene iznadprosječne temperature osigurat će aktivan napredak vegetativnih procesa u poljoprivrednim usjevima. Tijekom mjeseca, u pšenici i ječmu promatrat će se faza busanja, a u najnaprednijih usjeva u Podunavskoj nizini, do kraja ožujka dogodit će se početak izdizanja stabljike. U voćnim kulturama uočit će se različite faze, od bubrenja i pucanja pupova do zelenog cvasti i početka cvatnje u ranocvatućih vrsta koštičavog voća – marelice, breskve, trešnje.

U ožujku, predviđene minimalne temperature do minus 5°C, ovisno o trajanju njihova zadržavanja, predstavljat će rizik za voćne kulture uznapredovale u razvoju u fazama formiranja pupova i cvatnje.

Očekivane oborine krajem prve, sredinom druge dekade i krajem mjeseca povećat će zalihe vlage u tlu u jednometarskom sloju tla.

Predviđeno nestabilno vrijeme tijekom mjeseca ograničit će mogućnosti za provođenje sezonskih agrotehničkih aktivnosti. Prikladniji uvjeti za provođenje predcvatnog prskanja za zaštitu bilja u voćnjacima protiv uvenuća cvjetova (rana smeđa trulež), rupičavosti lišća, kovrčavosti lišća breskve i krastavosti jabučastog voća pojavit će se tijekom prve polovice prve dekade, na početku i na kraju druge dekade. U ožujku počinju optimalni agrotehnički rokovi za sjetvu suncokreta – od 15. ožujka za južnu Bugarsku i od 25. ožujka za sjevernu Bugarsku.

Izvor: NIMH