

Tijekom treće desetodnevnice u ožujku – opasnost od mraza

Автор(и): Растителна защита
Дата: 25.03.2024 Брой: 3/2024



Krajem drugog i početkom trećeg desetljeća ožujka, na mnogim mjestima u poljoprivrednim područjima zemlje stvoreni su uvjeti za nastanak mrazeva, koji su uzrokovali štete različitog stupnja na cvatu voćaka.

Tijekom sljedećeg sedmodnevnog razdoblja agrometeorološke će uvjete ponovno određivati dinamično vrijeme. Predviđene su prosječne dnevne temperature iznad biološkog minimuma potrebnog za odvijanje vegetacijskih procesa u jesenskim usjevima. U pšenici i ječmu nastavit će se faza busanja. Samo na pojedinačnim lokacijama u južnim regijama zemlje uočit će se faza izdizanja stabljike.

Prema podacima Poljoprivrednog instituta Dobrudža (DAI) - General Toshevo, od listopada 2023. do kraja veljače ukupna količina oborina iznosi 205 litara po četvornom metru. Međutim, tijekom prva dva mjeseca 2024. ukupno je palo 22 litara po četvornom metru. Istodobno su zabilježene visoke temperature iznad 16°C, a na mjestima i do 19,6°C. Pod takvim uvjetima pšenica obično ne ulazi u stanje mirovanja.

Posljednjih godina, tijekom mjeseca travnja, svjedoci smo onoga što je već postalo uobičajena pojava – naglih hladnoća s niskim temperaturama i mrazovima. Proljetna hladnoća u kombinaciji sa sušom može imati ozbiljan utjecaj na pšenicu.

U pojedinim poljima uočena je prisutnost septoriozne pegavosti lista, ali još je prerano za tretmane fungicidima, izvijestio je prof. dr. sc. Ivan Kiryakov iz DAI-a za Agri.bg. Krajem ožujka povjerenstvo koje je formirala Regionalna uprava za poljoprivredu pregledat će polja pšenice u Dobričkoj regiji kako bi se utvrdilo stanje usjeva, njihove razvojne faze i eventualni problemi koje treba rješavati u žitnim područjima.

U trajnim nasadima odvijat će se različite fenološke faze – od bubrenja pupova i pucanja pupova do cvjetnih pupova, cvatnje i listanja. Tijekom prvih dana razdoblja predviđeni su mrazovi i negativne minimalne temperature, što će predstavljati rizik za voćne kulture koje su uznapredovale u svom razvoju.

Očekivane oborine u drugoj polovici razdoblja ograničit će mogućnosti za terenske radove. Povoljniji uvjeti za provođenje sezonskih agrotehničkih aktivnosti – predsjetvena obrada tla i sjetva suncokreta, kao i tretmani zaštite bilja u poljoprivrednim kulturama, bit će dostupni na početku razdoblja. Tretmani se moraju provoditi pri mirnom vremenu i pri brzini vjetra do 2-3 m/s. Tijekom ovog razdoblja počinje optimalni agrotehnički rok za sjetvu suncokreta u sjevernoj Bugarskoj.

Izvor: NIMH i Agri.bg