

Agrotehničke aktivnosti u voćnjaku u svibnju

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 06.05.2024 *Брой:* 5/2024



Većinu dana prve dekade svibnja agrometeorološke će uvjete određivati nestabilno vrijeme s čestim oborinama, što će stvoriti uvjete za povećanje zarazne pozadine gljivičnih bolesti. Vegetativni procesi u poljoprivrednim usjevima odvijat će se umjerenim tempom pri temperaturama bliskim klimatskim normama.

Nakon nestabilnog vremena do sredine mjeseca, u drugoj polovici svibnja očekuje se promjena agrometeoroloških uvjeta. Predviđa se porast prosječnih dnevnih temperatura. Oborine se očekuju krajem svibnja. Tijekom cijelog mjeseca ostaje mogućnost tuče i rizik od oštećenja poljoprivrednih usjeva.

U voćnim rasadnicima

U rasadnicima se prati pravilan razvoj cijepljenih pupova. Po potrebi se vrši novo orezivanje izdanaka izraslih iz podloge.

Ako postoji rizik od prstenovanja, olabave se vezice na podlogama ponovno cijepljenim u proljeće.

Obrađuju se gredice, matične biljke i rasadnici. Po potrebi se biljke u gredicama prorjeđuju.

U voćnim nasadima

Po završetku cvatnje košnice se premještaju na drugu lokaciju – udaljenu najmanje 5 km.



U novozasađenim breskvicama s kupolastom ili poboljšanom kupolastom krošnjom vrši se formativna rezidba.

Vodi se briga o pravilnom ukorjenjivanju i razvoju stabala u novozasađenim voćnjacima – okopavanje, uklanjanje izdanaka, zalijevanje po potrebi. Stabla u mladim, gustim nasadima vežu se na žičanu konstrukciju.

Jake dvogodišnje i trogodišnje grane savijaju se i vežu za žice kako bi se smanjila njihova bujnost rasta. U mladim – 2 i 3-godišnjim nasadima, uklanjaju se neki plodovi na provodnici - središnjoj grani. Nastavlja se rad na prorjeđivanju bresaka. Nakon konačnog završetka opadanja plodova, nasadi se navodnjavaju. Organska tvar iz usjeva za zelenu gnojdbu se zaorava.

Tlo se održava bez korova i rahlji redovitom plitkom obradom kultivatorom ili drljačom. Krajem mjeseca voćke se gnoje s 15-20 kg/dka amonijevog nitrata ili istom količinom drugog dušičnog gnojiva.

Nastavlja se berba ranih sorti trešanja.

U nasadima jagoda



Nastavlja se proljetno-ljetna sadnja sadnica jagoda, pohranjenih u hladnjaku. Nakon sadnje primjenjuje se navodnjavanje zamagljivanjem. Područja zasađena u travnju se plijeve. U višim regijama, slama se polaže ispod cvjetnih stabljika do kraja mjeseca.

Berba se nastavlja. Kada se plodovi transportiraju na veće udaljenosti, mogu se brati malo ranije. U slučaju suše tijekom dozrijevanja plodova, potrebno je primijeniti navodnjavanje zamagljivanjem ili gravitacijsko navodnjavanje.

U nasadima malina

Provodi se redovita obrada tla. Izdanci nekih sorti vežu se za potpornu konstrukciju, dok se kod drugih sorti pazi da se ne spuštaju u međuredni prostor.



Tijekom cvatnje preporučljivo je osigurati dvije pčelinje zajednice na 10 dka.

U nasadima crnog ribiza



Nastavlja se njega – obrada i navodnjavanje za područja ukorjenjivanja. Uklanjaju se slabi i suvišni korijenski izdanci. U slučaju suše provodi se obilno zalijevanje. Počinje se s organizacijom berbe plodova crnog ribiza.

U nasadima s drugim kulturama

Limunske podloge se cijepe pupanjem. Nastavlja se cijepljenje kakija. Površina tla održava se bez korova i redovito rahli plitkom obradom. Osigurava se često i redovito zalijevanje do druge dekade.



Nastavlja se sadnja *Actinidia chinensis* na otvorenom. Nakon sadnje se zalijeva. Loze Actinidije redovito se vežu za pomoćne potporne grane. Stabljika se ne smije omotati oko potporne grane, a bočni izdanci na njoj se uklanjaju. Tri pčelinje zajednice osiguravaju se na 10 dka Actinidije.