


Tijekom treće dekade svibnja, za ozime žitarice dobro opskrbljene vlagom, doći će do formiranja i punjenja zrna.

Автор(и): Растителна заштита

Дата: 23.05.2024 Брой: 5/2024



Nakon prohladnog vremena za ovo doba godine sredinom svibnja, tijekom treće dekade mjeseca, prognozira se značajan porast temperatura, normalizacija toplinskih uvjeta i aktivacija vegetacijskih procesa kod poljoprivrednih kultura.

Očekivane oborine krajem druge i početkom treće dekade u većini poljoprivrednih regija održat će zalihe vlage u tlu unutar optimalnih granica u sloju od 50 i 100 cm – preko 85% PVK. Tijekom razdoblja, kod ozimih žitarica

dobro opskrbljenih vlagom, doći će do formiranja i punjenja zrna. U jugoistočnim regijama (agropostaja Karnobat), kod ječma će se, ranije nego inače, također primijetiti faza mliječne zriobe.

Kod kukuruza i suncokreta doći će do formiranja listova. Krajem razdoblja, kod suncokreta posijanog u agrotehničkom roku, također će se primijetiti početak formiranja cvata.

Prognozirano nestabilno vrijeme s čestim oborinama tijekom sljedećeg razdoblja održat će povećanu zaraznu pozadinu od gljivičnih patogena: kasna smeđa trulež na dozrijevajućim plodovima ranih sorti trešanja, siva plijesan na jagodama, plamenjača na vinovoj lozi i povrtnim kulturama, krastavost na vrstama jabučastog voća itd.



Trešnjina muha

Tijekom treće dekade svibnja trešnjina muha uzrokuje štete na srednje ranim sortama trešanja. Kako bi se ograničile štete od ovog štetnika, preporučuje se tretiranje na početku faze sazrijevanja plodova (kada plodovi trešnje počinju lagano ružičasti) insekticidom s kratkom karencom.

U vinogradima treba nastaviti s pregledima na prisutnost i štetno djelovanje ličinki prve generacije pepeljastog groždanog moljca, a u voćnim kulturama – za jabučnog savijača, šljivinog savijača i istočnog voćnog moljca.

Tijekom razdoblja, povećana vlažnost u gornjim slojevima tla ograničit će sezonsku obradu tla i borbu protiv konkurentne korovne vegetacije.

Izvor DHMZ