

Agrotehničke aktivnosti u voćnjaku u lipnju

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 07.06.2024 *Брой:* 6/2024



U lipnju će agrometeorološke uvjete određivati nestabilno vrijeme s oborinama, oko i iznad mjesečne norme, što će održavati dobre i vrlo dobre rezerve vlage u sloju tla od 50 cm i 100 cm – iznad 75-80% VK. Niže razine rezervi vlage u tlu predviđaju se mjestimično u krajnjim sjeveroistočnim i jugozapadnim regijama (Razgrad, Ruse, Silistra, Sandanski), gdje su majske oborine bile ispod mjesečne norme.

Početak lipnja razvoj poljoprivrednih kultura odvijat će se ubrzanim tempom, pod iznadprosječnim toplinskim uvjetima.

Tijekom većine dana druge dekade agrometeorološke uvjete određivat će temperature bliske uobičajenima za to razdoblje.

Tijekom treće dekade lipnja predviđaju se iznadprosječni toplinski uvjeti, s prognoziranim maksimalnim temperaturama do 35-36°C.

U voćnim rasadnicima

Sjetvene gredice se gnoje s 6-8 kg amonijevog nitrata ili istom količinom drugog dušičnog gnojiva po dekaru i okopavaju. Po potrebi se navodnjavaju. Matični nasadi se gnoje s 10-15 kg amonijevog nitrata ili istom količinom drugog dušičnog gnojiva po dekaru i nagrću zemljom. Po potrebi se navodnjavaju prije nagrtanja. U rasadnicima se provodi odstranjivanje pupova kako bi se olakšao normalan rast cijepova. Podloge i rasadnici pripremaju se za cijepljenje pupanjem.

U voćnim nasadima

Pazi se da se vezovi na granama docijepljenih voćaka i divljih formi ne urežu, te ih je po potrebi potrebno na vrijeme olabaviti. Konkurentne izbojke koji su izrasli iz matične biljke treba promptno ukloniti.

Novo posađene sadnice redovito se okopavaju. Po potrebi ih zalijevati.

Nakon druge dekade, mladi voćni nasadi se gnoje s 15-20 kg amonijevog nitrata po dekaru i provodi se plitka obrada tla. Prilikom formiranja palmete, skeletne grane se savijaju kada dosegnu ukupnu duljinu od 2 – 2,5 m za prvi kat, 1,5-2 m za drugi, i 1 m za treći. Kod slabije rastućih stabala, postavljaju se pod kutom od 45-50°, a kod bujnih stabala – pod kutom od 45-45° u odnosu na horizontalu. Kada jedan kat ima skeletne grane različitih duljina, savija se samo jaka, dok se slaba ostavlja da raste i savija se kasnije.



Nastavlja se mehaničko prorjeđivanje plodova breskve.

U područjima s osiguranim navodnjavanjem siju se usjevi za zelenu gnojidbu.

Počinje masovna berba trešanja i višanja.



U nasadima jagoda

Sade se posljednje sadnice jagoda, pohranjene u hladnjaku. Nastavlja se plijevljenje mladih i novoposađenih usjeva. Po potrebi navodnjavati. Berba se nastavlja. Ne brati tijekom vrućih sati dana ili kada se stvorila rosa. Za svježu potrošnju beru se zajedno s čaškom.

Na toplijim uzgojnim mjestima, nakon berbe posljednjih plodova, slama se odmah sakuplja i uklanja. Nasadi se gnoje s 8-10 kg amonijevog nitrata ili istom količinom drugog dušičnog gnojiva po dekaru, te se provodi prva posliježetvena obrada. Ako je navodnjavanje potrebno, obavlja se prije gnojidbe.



U nasadima malina

Provodi se redovita obrada tla. Po potrebi zalijevati. U plodonosnim nasadima nastavlja se čišćenje redova od vrlo slabih i suvišnih izdanaka. Žičana konstrukcija se održava snažnom. U nekim područjima, oko sredine lipnja, počinje berba plodova ranih sorti. Kada počne zrenje, pčelinje zajednice se premještaju na druge nasade, ali na udaljenosti ne manjoj od 5 km.



U nasadima crnog ribiza

Tlo u gredicama za ukorjenjivanje obrađuje se 2-3 puta ovisno o navodnjavanju, oborinama i prisutnosti korova. Redovita obrada provodi se i na mladim i na plodonosnim nasadima. Oko sredine mjeseca, na nekim toplijim uzgojnim mjestima, počinje berba plodova.

U nasadima s drugim kulturama

Nastavlja se cijepljenje limunovih podloga. Nastavlja se briga za vanjsko ukorjenjivanje reznica nara, smokve i morskog trna, pri čemu se rasadnik redovito okopava i zalijeva. Provode se potrebni tretmani protiv korova. Pred kraj mjeseca, prošlogodišnje neobrađene podloge cijepa se pupovima kakija. Nastavlja se vezivanje aktinidije za pomoćne stupove. Gnojdba se provodi s posljednjom 1/3 godišnje norme dušika određene za aktinidiju. Bočni izbojci na glavnoj stabljici aktinidije uklanjaju se kako bi se potaknuo njen razvoj i cjelokupno oblikovanje. Oblikuje se u obliku slova T.