


Lipanj – od nestabilnog vremena s oborinama do iznadprosječnih vrućina

Автор(и): Растителна заштита
Дата: 10.06.2024 Брой: 6/2024



U lipnju će agrometeorološke uvjete određivati nestabilno vrijeme s oborinama, oko i iznad mjesečne norme, što će održavati dobre i vrlo dobre zalihe vlage u sloju tla od 50 cm i 100 cm – preko 75-80% PK (poljskog kapaciteta). Niže razine zaliha vlage u tlu prognoziraju se ponegdje u krajnjim sjeveroistočnim i jugozapadnim regijama (Razgrad, Ruse, Silistra, Sandanski), gdje su svibanjske oborine bile ispod mjesečne norme.

Početak lipnja razvoj poljoprivrednih kultura odvijat će se ubrzanim tempom, pod iznadprosječnim toplinskim uvjetima. Zbog visokih temperatura tijekom proljetne vegetacije pšenice i ječma, one će svoj razvoj završiti ranije nego inače. Tijekom prvih deset dana lipnja, za ječam će se u poljskim područjima primijetiti masovna

voštana zrelost, a na kraju desetodnevnog razdoblja - puna zrelost. Za pšenicu će se tijekom ovog razdoblja pojaviti mliječna, prijelazna u voštanu i voštana zrelost.

Tijekom većine dana drugog desetodnevnog razdoblja, agrometeorološke uvjete određivat će temperature bliske uobičajenim za to razdoblje. Sredinom desetodnevnog razdoblja, ozime žitarice na visokim poljima ući će u fazu sazrijevanja. Kod kukuruza će se javljati formiranje listova, a kod suncokreta će prevladavati formiranje cvjetnih glavica.

Tijekom većeg dijela razdoblja od 7. do 13. lipnja, agrometeorološke uvjete određivat će toplo vrijeme s vjerojatnošću lokalnih oborina i tuče. Maksimalne temperature prelazit će 30°C tijekom cijelog razdoblja, dosežući 38°C u Trakijskoj nizini, što je preduvjet za toplinski stres i pogoršanje uvjeta za normalan razvoj kultiviranih biljaka u njihovim vegetativnim i generativnim fazama.

Početkom drugog desetodnevnog razdoblja lipnja, kod kukuruza će se javljati formiranje listova; za suncokrete posijane u optimalnom poljoprivrednom roku - formiranje cvjetnih glavica; za mahunarke (grah, soja) - pupanje i cvjetanje. Kod ječma na poljskim površinama prevladavat će voštana zrelost. Za pšenicu će se pojaviti masovna mliječna i voštana zrelost. Kod uljane repice bit će uočena faza sazrijevanja.

Predviđeni iznadprosječni toplinski uvjeti tijekom trećeg desetodnevnog razdoblja lipnja ubrzat će vegetaciju proljetnih usjeva, a neki od njih ući će u reproduktivne faze svog razvoja. Kod usjeva suncokreta posijanih u optimalnom poljoprivrednom roku, bit će zabilježen početak faze cvatnje, a kod ranijih hibrida kukuruza - metličanje i otpuštanje peludi. Tijekom ovog razdoblja prognoziraju se maksimalne temperature do 35-36°C, što će negativno utjecati na cvatnju i oplodnju povrtlarskih kultura.

U lipnju su prognozirane česte kiše preduvjet za razvoj gljivičnih bolesti: kasne smeđe truleži, krastavosti i pepelnice na voćkama; plamenjača na povrtnim kulturama; plamenjače, pepelnice i sive plijesni na vinovoj lozi. Pogodniji uvjeti za provođenje zaštitnih prskanja bilja stvorit će se tijekom druge polovice mjeseca.

! Visoke temperature i niska atmosferska vlažnost ograničit će mogućnosti provođenja mjera zaštite bilja i otežati terenske radove.