

Agrotehničke aktivnosti u voćnjaku u srpnju

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 07.07.2024 *Брой:* 7/2024



Većinu dana u drugoj i trećoj dekadi srpnja očekuje se relativno suho i vrlo vruće vrijeme, s maksimalnim temperaturama između 35-40⁰C. Predviđene visoke temperature u srpnju i relativno suho vrijeme ograničit će razvoj gljivičnih bolesti u višegodišnjim nasadima, s izuzetkom pepelnice. Očekivane oborine oko i ispod mjesečne norme zahtijevat će provedbu pojačanog režima navodnjavanja.

U voćnim rasadnicima

Sjemenjaci se redovito navodnjavaju i obrađuju kako bi se osigurao što veći postotak standardnog podlog materijala. Matične zasade se navodnjavaju i, po potrebi, okopavaju.

Kako bi se osigurali uvjeti za dobar razvoj cijepljenih biljaka, u rasadničkim blokovima druge godine po potrebi se provodi odstranjivanje pupova. Provodi se redovita obrada tla i navodnjavanje, posebno u rasadnicima krušaka.

U rasadničkim blokovima prve godine započinje cijepljenje podloga, a u onima gdje pupovi nisu primljeni, provodi se ponovno cijepljenje. Otprilike dva tjedna nakon cijepljenja, pregledavaju se veze. One koje su se urezale u koru se popuštaju.

U voćnjacima

Nastavlja se rad na savijanju kosturnih grana pri formiranju stabala u obliku palmete.

Navodnjavanjem se održava vlažnost tla iznad 70% poljskog vodnog kapaciteta.

Pomoću diska, kultivatora, rotacije i rotacije s pomaknutim dijelom, površina tla u međuredovima i unutar redova održava se obrađenom i bez korova.



Nastavlja se berba trešanja i višanja, a započinje i masovna berba marelice i breskve.

U nasadima jagoda

Nastavlja se njega navodnjavanja novouspostavljenih nasada jagoda, posebno onih zasađenih u lipnju. U nižim i toplijim područjima, gdje je berba plodova završila, slama se skuplja, uklanja i spaljuje.



Berba plodova se nastavlja na višim i hladnijim lokalitetima.

Nakon uklanjanja slame, nasadi se navodnjavaju i obrađuju, nakon što su prethodno gnojani s 10-12 kg amonijevog nitrata po dekaru.

Matične zasade namijenjene proizvodnji sadnog materijala se navodnjavaju, gnoje s 15-20 kg amonijevog nitrata po dekaru i okopavaju. Izbojci u nasadima iz kojih se ne uzima sadni materijal se izrezuju.

Određuju se i pripremaju nove površine za nasade jagoda za jesensku sadnju na otvorenom. Prije duboke obrade tla, površina se gnoji s 2-4 t stajskog gnoja, 60-80 kg superfosfata i 20-30 kg kalijevog sulfata po dekaru.

U nasadima malina

Nastavlja se njega navodnjavanja i obrade novih nasada. Rodni nasadi se navodnjavaju i obrađuju. Norma navodnjavanja je 50-60 dm³ po dekaru.



Provodi se masovna berba plodova.

Vodi se računa o matičnim nasadima malina – navodnjavanje i obrada, kako bi se osigurala maksimalna količina sadnog materijala – izdanaka.

Nasad se pregledava, uklanjaju se netipične biljke drugih sorti, a stari, otplodni izbojci se režu, skupljaju i spaljuju.

U nasadima crnog ribiza

Nastavlja se njega gredica za ukorjenjivanje. Tlo se navodnjava i obrađuje, a u mladim i rodnim nasadima ne dopušta se zakorovljenost.

Nasad se gnoji dušikom (1/3 godišnje doze).

Provodi se masovna berba plodova. Tijekom berbe, netipične biljke drugih sorti se označavaju za kasnije iskorijenjivanje, kao i bolesne i slabe biljke. Nakon berbe, uklanjaju se slomljeni, nerazvijeni i suvišni izbojci.

U nasadima s drugim kulturama

Označavaju se željene sorte i oblici smokava za dobivanje reznica. Uzimaju se reznice aktinidije, lovora, crne aronije, obične pasje trnine i nara za ukorjenjivanje u stakleniku s umjetnom maglom. Reznice se pripremaju i tretiraju otopinom indolmaslačne kiseline 5 sekundi. Ukorjenjuju se u staklenicima s umjetnom maglom u supstratu od dva dijela perlita i jednog dijela treseta.

Započinje cijepljenje podloga kavkaske persimone sortama persimone i sadnica aktinidije kultiviranim sortama.

Nastavlja se vezivanje izdanaka aktinidije za žičanu konstrukciju. Provodi se ljetno rezidbe aktinidije. Žičana konstrukcija se postavlja već pri sadnji, a žice se podižu na 1-1,20 m i 1,80-2 m iznad površine tla.

Cijepe se žižula i pistacija.

Beru se plodovi smokve, a pred kraj mjeseca započinje berba plodova obične pasje trnine i crne aronije.