

# Aktivnosti zaštite bilja u voćnjaku u kolovozu

*Автор(и):* ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

*Дата:* 05.08.2024 *Брой:* 8/2024



Osim pepelnice na jabuci i breskvi, rizik od gljivičnih bolesti gotovo je prošao. Štete od štetnih kukaca i grinja također su uvelike smanjene jer stari listovi nisu pogodni za njihov razvoj. Osim toga, neki od njih prelaze na svoje srednje domačine.

Mjere zaštite bilja u kolovozu uglavnom su usmjerene na zaštitu uroda voća od napada crva i listova od minirajućih moljaca, stjenica i drugih štetnika koji razvijaju nekoliko generacija.

Tretmani moraju biti u skladu s prethodnim rokovima primjene pesticida i vremenom berbe. Treba ih provoditi tijekom hladnijih sati dana.

*U voćnjacima*

Na mjestima rukovanja, plodovi breskve se pregledavaju na prisutnost istočnjačkog voćnog moljca u nezaraženim područjima.

Svi nasadi se prate na prisutnost jesenjeg paučinjara. Kada se prekorači prag ekonomske štete, usjevi se tretiraju s Dipel 2 X (100 g/ha).



### *Voćni potkornjak*

Voćnjaci zaraženi voćnim potkornjakom prskaju se jednim od proizvoda – Delegate 250 WG (30 g/ha), Rapax 100-200 (ml/ha), Dipel DF 50-150 (g/ha), Avant 150 EC (33,3 ml/ha), Decis 100 EC (8,75-12,25 ml/ha), Coragen 20 SC (16-30 ml/ha). Za ometanje parenja također možete koristiti kombinirane dispenzere feromona – Isomate – CLR (100 kom/ha).

Debla i debele grane voćaka zaražene potkornjacima tretiraju se jednim od proizvoda – Decis 100 EC (12,25 ml/ha), Coragen 20 SC (30 ml/ha), Sumi Alpha 5 EC (0,03%), Karate Zeon 5 SC (15 ml/ha).

Nasadi breskve prskaju se jednim od proizvoda – Sulfur WG (600 g/ha), Solfo 80 WG (750 g/ha), Systhane 20 EW (0,03%), Luna Experience (50-75 ml/ha), Flint Max 75 WG (0,02%) protiv pepelnice; s proizvodom na bazi deltametrina – Decis 100 EC (12,5 ml/ha), Meteor (90 ml/ha), Dekka EC (50 ml/ha) protiv istočnjačkog voćnog moljca, Anarsia (druga generacija), dudove štitaste uši, štitaste uši San Jose (u područjima rasprostranjenosti);

te s Apollo 50 SC (40 g/ha), Valmek (60-96 ml/ha) ili drugim proizvodom na bazi abamektina, Voliam Targo 063 SC (75 ml/ha), Naturalis (100-150 ml/ha) protiv grinja.

Otpale plodove lješnjaka zaražene crvima skupljaju se i uništavaju.

Nasadi jabuka tretiraju se s piretroidnim insekticidom – Decis 100 EC (7,5-12,5 ml/ha), Sumicidin 5 EC (0,02%), Afikar 100 EC (15 ml/ha), Efcymerin 10 EC (15 ml/ha) i jednim od proizvoda – Apollo 50 SC (40 g/ha), Valmek (60-96 ml/ha) ili drugim proizvodom na bazi abamektina, Voliam Targo 063 SC (75 ml/ha), Naturalis (100-150 ml/ha) protiv minirajućeg moljca i grinja.



### *Krušina stjenica*

Nasadi krušaka jako zaraženi krušinom buhom i krušinom stjenicom prskaju se insekticidom na bazi deltametrina – Decis 100 EC (12,5 ml/ha), Meteor (90 ml/ha), Deko EC (50 ml/ha). Ovo prskanje je također učinkovito protiv jabučnog savijača u kruški.

Stabla kestena prskaju se protiv kestenovog žižaka s Coragen 20 SC (18-30 ml/ha).

### *U nasadima jagoda*



## *Jagodina grinja*

Nasadima jagoda zaraženim jagodinom grinjom tretira se jednim od proizvoda – Voliam Targo 063 SC (80 ml/ha), Laota, Bermektin, Valmek (15-100 ml/ha), Sulfur WG (500-700 g/ha), Heliosulfur C (150-750 ml/ha).

Sadni materijal jagode namijenjen sadnji u kolovozu se pregledava. Kada se otkriju jagodina grinja i drugi štetnici, on se dezinficira.

## *U nasadima crnog ribiza*



*Ribizova mjerachica*

Nasade zaražene ribizovom mjerachicom prskamo kontaktnim insekticidima iz svih skupina. Možete koristiti jedan od proizvoda – Decis 100 EC (12,25 ml/ha), Coragen 20 SC (30 ml/ha), Sumi Alpha 5 EC (0,03%), Karate Zeon 5 SC (15 ml/ha).