

Od čega i kako zaštititi voćke u rujnu

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 08.09.2024 *Брой:* 9/2024



Pred kraj vegetacijskog razdoblja razvoj bolesti se usporava, ali ne prestaje potpuno.

Predviđene oborine tijekom drugog i prve polovice trećeg desetljeća povećat će rizik od razvoja gljivičnih patogena na usjevima koji sazrijevaju – kasne smeđe truleži, kasne krastavosti na plodovima kasnih sorti voćaka.

Gustoća populacije štetnika značajno se smanjuje. Mnogi od njih su ušli u neaktivne faze – kukuljice, jaja. Ipak, kasno izlegle ličinke druge generacije voćnog moljca nastavljaju uzrokovati crvičavost ploda. Štetni su i drugi štetnici. Stoga se zaštitne mjere na biljkama nastavljaju tijekom mjeseca.

U voćnjacima

Prostorije za skladištenje voća se dezinficiraju. To obavlja stručnjak!



Gubar — *Lymantria dispar*

Za utvrđivanje populacije gubara koja prezimljava, broje se nakupine jaja na deblima i debelim granama 40–60 stabala, a za dudovog svilca – prstenovi jaja na dvogodišnjim, trogodišnjim i četverogodišnjim izdancima.

Plodovi breskve se pregledavaju na mjestima rukovanja kako bi se u područjima gdje se još nije pojavila otkrila istočna voćna moljca.

Otprilike dva tjedna prije berbe, voćnjaci jabuka i krušaka čiji su plodovi namijenjeni skladištenju tretiraju se sredstvom Captan 80 WG (150–180 g/da) kako bi se zaštitili od kasne krastavosti i drugih bolesti koje se razvijaju u skladištima voća.

Za utvrđivanje gustoće populacije pupoljkaša kruške krajem mjeseca, potrese se 10 stabala na 500 jutara, raspršenih po voćnjaku – u početku svaki drugi dan, a nakon što se pronađu prvi kukci, svaki dan.

Stabla kestena prskaju se početkom mjeseca, prije polaganja jaja, sredstvom Coragen 20 SC (18–30 ml/da) ili nekim drugim kontaktnim insekticidom za suzbijanje kestenovog pipka. Prskanje se ponavlja još dva puta u razmacima od 7–10 dana.

U nasadima jagoda

Prije presađivanja, za sastojine bez korova, nasadi jagoda tretiraju se sredstvom Roundup Energy (300–500 ml/da za jednogodišnje i dvogodišnje korove i 500–800 ml/da za višegodišnje korove).



Jagodin korijenov pipak

Nasadima jagoda se navodnjava jednim od insekticida – Decis 100 EC (17,5 ml/da) ili drugim proizvodom na bazi deltametrina, Mospilan 20 SP (30 g/da), Naturalis (300 ml/da) dok se tlo ne navlaži do dubine od 15 cm protiv ličinki korijenovih pipaka.

Sadni materijal jagoda pregledava se na bolesti i štetnike koji se prenose s njim – bijele i ljubičasto-smeđe pjegavosti listova, korijenovi pipci, jagodina nematoda, jagodina grinja, virusne bolesti itd.

Izbojci jagoda se dezinficiraju ako su zaraženi jagodinom grinjom ili jagodinom nematodom uranjanjem u vodu temperature 45–50 °C tijekom 13–15 minuta.