

Odgođena sjetva ozimog uljane repice i uvjeti za infekcije i razvoj patogena u kasnim poljoprivrednim usjevima

Автор(и): Растителна защита

Дата: 18.09.2024 Брой: 9/2024



Nakon dugotrajne suše, početkom rujna u mnogim dijelovima zemlje (Silistra, Varna, Dobrič, Stara Zagora, Burgas, Haskovo, Sandanski) pala je ekonomski značajna količina oborina veća od 30–40 l/m².

Ove su oborine bile kasne čak i za kasne ratarske kulture, koje su, kao rezultat deficita vlage u tlu i ljetnih temperatura iznad normale, završile svoj razvoj mnogo ranije od uobičajenih rokova.

Tijekom tekućeg tjedna također će agrometeorološke uvjete određivati nestabilno vrijeme. Za razdoblje se predviđaju oborine, koje će poboljšati zalihe vlage u gornjim slojevima tla i uvjete za provođenje sezonske

obrade tla.

Zbog suše, predstjetvena obrada površina predviđenih za sjetvu ozimog uljane repice, kulture koja zahtijeva preciznu pripremu tla, odgođena je. Iz tog razloga, u mnogim dijelovima zemlje sjetva uljane repice provest će se nakon optimalnih agrotehničkih rokova. Oni istječu krajem druge desetodnevnice rujna.

Većinu dana u razdoblju, predviđeno hladnije vrijeme s čestim oborinama stvorit će uvjete za infekcije i razvoj patogena u kasnim poljoprivrednim kulturama: kasna smeđa trulež na voćnim stablima, siva plijesan na grožđu, plamenjača na povrtnim kulturama.



Tijekom druge desetodnevnice rujna, u kupusu uzgajanom za jesensku proizvodnju, potrebno je pratiti štetnike: gusjenice kupusova bijelca, kupusova moljca, dijamantnog moljca, a kada njihova gustoća prijeđe ekonomski prag štetnosti (3–5 gusjenica po biljci), potrebna je obrada insekticidima s kratkim rokom čekanja do berbe.

Nadolazeće razdoblje pogodno je za sjetvu špinata i drugog lisnatog povrća za jesensku proizvodnju.

Izvor: DHMZ

