

Listopad – oborine od agronomске važnosti i dobri uvjeti za razvoj ozimog uljanog repice

Автор(и): Растителна защита
Дата: 06.10.2024 Брой: 10/2024



U listopadu će agrometeorološke uvjete određivati temperature oko i iznad klimatskih normi te oborine blizu mjesečnih prosjeka. Nakon ljetne suše, ekonomski značajne oborine u rujnu, u pojedinim područjima istočne i na pojedinim mjestima zapadne Bugarske, poboljšale su vlažnost gornjih slojeva tla i uvjete za provođenje sezonske obrade tla.

Oborine krajem rujna bile su neravnomjerno raspoređene. Na mnogim mjestima u središnjoj i sjeveroistočnoj Bugarskoj zabilježene su količine oborina do i iznad 30-35 l/m² (Veliko Trnovo - 40 l/m², Ruse - 43 l/m², Razgrad - 36 l/m², Silistra - 45 l/m², Varna - 45 l/m², Dobrič - 53 l/m²), što je dovelo do značajnog poboljšanja zaliha vlage u gornjim slojevima tla i uvjeta za provođenje sezonske obrade tla. Za razliku od središnjih i istočnih regija, u

dijelovima zapadne i južne Bugarske oborine na početku jeseni nisu imale ekonomski značaj. U tim dijelovima zemlje, suho i zbijeno tlo ozbiljno otežava duboku orbu i predstjetvenu obradu površina namijenjenih sjetvi ozimih usjeva.

Tijekom većine dana prve dekade listopada ne predviđaju se značajnije oborine i uvjeti će omogućiti pripremu polja i njihovu sjetvu ozimim žitaricama. Ljetna suša ometala je pravovremenu sjetvu ozimog uljane repice te će se na mjestima u ratarskim regijama središnje Bugarske površine sijati izvan agrotehničkog roka. Vrlo je vjerojatno da kasno posijani usjevi neće ući u fazu rozete tijekom svoje jesenske vegetacije, što jamči uspješno prezimljavanje usjeva bez oštećenja.

U listopadu se odvijaju optimalni agrotehnički rokovi za sjetvu ozimih žitarica. Rok za sjevernu Bugarsku je tijekom prve polovice mjeseca, za južnu Bugarsku tijekom druge polovice mjeseca, a za područja Crnog mora tijekom treće dekade. Očekivane oborine krajem prve i početkom druge dekade, kao i tijekom druge polovice treće dekade mjeseca, bit će od značajne važnosti za normalan tijek početnih faza vegetacije pšenice i ječma. U listopadu će se, ovisno o rokovima sjetve, u pšenici moći uočiti sljedeće faze – nicanje, prvi i treći list.



Predviđeno toplo vrijeme u drugoj polovici mjeseca bit će preduvjet za povećanje populacije obične voluharice. Polja s jesenskim usjevima potrebno je nadzirati, a kada se dosegne prag ekonomske štete – PES: 2 aktivne kolonije/jutro – potrebno ih je tretirati.

Uvjeti za terenske radove bit će prisutni sredinom druge i tijekom prve polovice treće dekade, kada se predviđa relativno suho vrijeme.



U listopadu, u nasadima jabuka i krušaka zahvaćenim krastavošću, kako bi se smanjila infekcija, preporučljivo je na početku opadanja lišća, nakon branja plodova, provesti tretman s 5%-tnom otopinom uree.

Za koštuničavo voće, nakon masovnog opadanja lišća, preporuča se prskanje s 2%-tnom bordoškom smjesom protiv uzročnika rupičaste pegavosti lišća, rane smeđe truleži i kovrčavosti lišća breskve.

Početkom listopada predviđaju se prizemni mrazevi, koji će ograničiti mogućnosti za dodatnu proizvodnju od kasnih povrtnih kultura osjetljivih na oštećenja od mraza.

Izvor: NIMH