

Agrotehničke aktivnosti u voćnjaku u listopadu

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 08.10.2024 *Брой:* 10/2024



U listopadu se kod svih vrsta voćaka aktivno odvija proces nakupljanja rezervnih hranjivih tvari.

Tijekom mjeseca agrometeorološke će uvjete određivati temperature oko i iznad klimatskih normi te oborine blizu mjesečnih normi.

Tijekom većine dana prve desetodnevnice listopada ne predviđaju se značajnije oborine. Kiša se očekuje krajem prve i početkom druge desetodnevnice, kao i tijekom druge polovice treće desetodnevnice mjeseca.

Uvjeti za terenske radove nastupit će sredinom druge i tijekom prve polovice treće desetodnevnice, kada se predviđa relativno suho vrijeme.

U voćnim rasadnicima



Vodi se računa o očuvanju klijavosti sjemena koštičavog voća prikupljenog za stratifikaciju.

Započinje priprema za vađenje podloga iz sjemenskih gredica i dvogodišnjih rasadničkih stabala.

Podloge iz sjemenskih gredica i cijepljeno drveće vade se nakon završetka vegetacijskog razdoblja – u drugoj polovici listopada i u studenom.

Biljke ne smiju imati listova. Ako listovi nisu otpali, u tu se svrhu koristi 0,1-0,2% kalcijev klorid. Navodnjavanje olakšava vađenje.

U voćnjacima



Nastavlja se berba badema i nekih plodova šljive.

Berbu jesensko-zimskih sorti jabuka i krušaka potrebno je završiti najkasnije do sredine mjeseca.

Tlo u međuredovima jednogodišnjih i mladih voćnjaka duboko se obrađuje.

Ako nije provedena predsadna gnojidba fosfornim i kalijevim gnojivima, primjenjuje se 50-60 kg superfosfata i 20-22 kg kalijevog sulfata – ili drugo fosforno i kalijevo gnojivo u istoj količini po dekari.

Fosforna i kalijeva gnojiva također se duboko ugrađuju u rodne voćnjake.



U nasadima jagode

Nastavlja se osnivanje novih nasada jagode.

Sadnja izbojaka mora biti završena najkasnije do sredine mjeseca. Izbojci se trebaju pikirati, s malom količinom zemlje oko korijena. Nakon sadnje provodi se navodnjavanje s $0,5\text{--}1\text{ dm}^3$ vode po biljci.

Provodi se završna obrada rodni nasada – na dubini od 10-15 cm, uz blago okopavanje biljaka.

Nastavlja se vađenje i priprema za hladno skladištenje izbojaka namijenjenih za proljetno-ljetnu sadnju.

U nasadima maline

Pripremaju se površine za osnivanje novih nasada maline.

Rodni nasadi se gnoje s 2-3 t stajskog gnoja, 20-30 kg superfosfata i 10-15 kg kalijevog sulfata – ili drugim fosfornim i kalijevim gnojivom u istoj količini po dekari, nakon čega se gnojiva duboko zaoravaju – na 20-25 cm dubine.

U nasadima crnog ribiza

U sušnim uvjetima, rodni i mladi nasadi se navodnjavaju.

Provedi se jesenska gnojidba s 1-2 t stajskog gnoja, 20-40 kg superfosfata i 10-15 kg kalijevog sulfata – ili drugim fosfornim i kalijevim gnojivom u istoj količini po dekari. Tlo u međuredovima obrađuje se na dubini od 15-18 cm, a u blizini biljaka – na 5-6 cm.

U nasadima ostalih kultura

Provedi se jesenska orača na dubini od 18-20 cm, što pridonosi dobrom zadržavanju vlage u tlu od zimskih oborina.

Nakon treće godine, nadzemni dio nasada lovora reže se na 20-25 cm od korijenskog vrata. Izrezana stabljika odnose se u suhu, dobro prozračenu prostoriju radi sušenja listova.



Započinje berba kaki voća, narana i kivija (Actinidia).

Krajem mjeseca, u slučaju opasnosti od mraza i relativno suhog vremena, sve biljke lovora (lovorov list, lovor) se okopavaju plugom.

Nastavlja se berba plodova smokve.

Nastavlja se njega zelenih reznica aktinidije, crne aronije, obične topole i drugih, postavljenih za ukorjenjivanje.

Započinje prikupljanje sjemena rujevine za proizvodnju podloga pistacije.