

Mjere zaštite bilja u voćnjaku u listopadu

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 08.10.2024 *Брой:* 10/2024



Početkom listopada predviđeni su mrazevi.

U listopadu, u nasadima jabuka i krušaka zahvaćenim paršom, kako bi se smanjila infekcija, preporučuje se, na početku opadanja lišća i nakon branja plodova, provesti tretman s 5%-tnom otopinom uree.

Za koštuničave voćke, nakon masovnog opadanja lišća, preporuča se prskanje s 2%-tnom bordoaskom smjesom protiv uzročnika rupičavosti lišća, rane smeđe truleži i kovrčavosti lišća breskve.

U voćnjacima

Na voćnim stablima postavljaju se kutije za gniježđenje i hranilice kako bi se privukle korisne ptice.

Skupljaju se zamke od valovitog kartona s prisutnim gusjenicama jabukovača, šljivina moljca i orahovača te se postavljaju u viseće kaveze u voćnjacima – djetlići i druge ptice uništavaju gusjenice u trakama.



Na deblu svakog stabla u voćnjacima zahvaćenim zimskim mjesečarima postavlja se jedna ljepljiva traka na visini od 20–100 cm. Trake su izrađene od papira širine 20 cm, s gornjim i donjim rubom povezanim. Za premazivanje se koristi sporo suhuće ljepilo. Kako bi se spriječilo kukce da se sakriju prije nego što dođu do trake, ispucala kora od trake pa sve do površine tla se unaprijed ostruže.

Plodovi jabuka i krušaka pregledavaju se na mjestima razvrstavanja i rukovanja na prisutnost kalifornijske štitaste uši i dudove štitaste uši u nezaraženim područjima.



Gnezda gusjenica jesenjeg paučinjaka broje se kako bi se utvrdila gustoća populacije štetnika.



Nastavlja se s tresenjem stabala, započetim krajem rujna, kako bi se utvrdila gustoća populacije pupoljkaša kruške. Kada gustoća prijede ekonomski prag, prije polaganja jaja, stabla se prskaju kontaktnim insekticidom iz

bilo koje skupine – Decis 100 EC (12,25 ml/da) ili drugim proizvodom na bazi deltametrina, Sumi Alpha 5 EC (0,03%), Karate Zeon 5 SC (15 ml/da), Lamdex extra (100–120 g/da) i drugi.

Nasadi krušaka prskaju se protiv buhe kruške s jednim od insekticida – Bermectin (40–120 ml/da) ili drugim proizvodom na bazi abamektina, Voliam Targo 063 SC (75 ml/da), Imidan 50 WG (150 g/da), Delegate 250 WG (30 g/da), Dekka EC (50 ml/da) ili drugim proizvodom na bazi deltametrina, Movento 100 SC (0,12–0,15%), Naturalis (100–200 ml/da), Sineis 480 SC (30–44 ml/da), Flipper (1–2 l/da).



Izbojci s brašnastom uši jabuke parazitiranom od parazitoidne ose *Aphelinus mali* režu se i pohranjuju na hladnom mjestu i u hladu pod zaklonom. Brašnaste uši jabuke koje sadrže ovu osu crne su boje i nemaju izlaznu rupu. U proljeće sljedeće godine koriste se za biološku kontrolu.