

Neravnomjerno raspoređene oborine u zemlji dovode do razlika u fenološkom stanju ozimih žitarica.

Автор(и): Растителна заштита

Дата: 20.11.2024 Брой: 11/2024



Do kraja drugog i početkom treće dekade studenog bit će određene prosječnim dnevnim temperaturama iznad klimatskih normi i iznad biološkog minimuma potrebnog za vegetaciju ozimih žitarica.

Tijekom razdoblja ne očekuju se značajne oborine niti promjene u razinama jesenskih rezervi vlage u tlu. Oborine koje su pale tijekom proteklog razdoblja bile su neravnomjerno raspoređene. Na mnogim mjestima u sjeverozapadnim regijama, u Gornjotračkoj nizini i u krajnje južnim dijelovima zemlje zabilježene su oborine ispod 10-12 l/m² – potpuno nedovoljne za prevladavanje deficita vlage u ozimim žitaricama.

U nekim od istočnih regija (Razgrad, Ruse, Silistra, Sliven, Karnobat) dogodile su se značajne oborine – iznad 25-30 l/m². U tim regijama došlo je do poboljšanja rezervi vlage u tlu u gornjim slojevima tla i uvjeta za vegetaciju jesenje sjetve.

Dok su u zemlji listopad i početak studenog bili razdoblja suše i nedostatka poljoprivredno učinkovitih oborina, u regiji Dobrič opažaju se dovoljne rezerve vlage u tlu, što pridonosi dobrom razvoju usjeva pšenice. Temperature omogućuju normalno nicanje tamo gdje je vlage dovoljno. Niže temperature u Dobrudži štite jesensku sjetvu od napada štetnika, poput muha žitarica i lisnih uši.

Tijekom razdoblja uočit će se različite faze u pšenici – klijanje, nicanje (agrometeorološke postaje: Knezha, Nikolaevo, Kazanlak, Plovdiv, Haskovo, Yambol) i formiranje 1.–2. i 3. lista (Novachene). Razlike u fenološkom stanju ozimih žitarica posljedica su produžene jesenske suše i odgođene sjetve.

Tijekom razdoblja uvjeti će biti pogodni za sadnju voćaka i za provođenje fitosanitarnih aktivnosti u voćnim nasadima.

Izvor: DHMZ