

Početkom prosinca, očekivane oborine povećat će zalihe vlage u gornjim slojevima tla.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 01.12.2024 Брой: 12/2024



Tijekom sljedećeg sedmodnevnog razdoblja, agrometeorološki uvjeti će se bitno promijeniti. U zapadnoj Bugarskoj predviđa se značajno sniženje temperatura, ali bez kritičnih minimalnih vrijednosti za jesenske usjeve koji zaostaju u svom razvoju. Hladnoća na početku prosinca dovest će do usporavanja, a na višim poljima, gdje se očekuje stvaranje snježnog pokrivača, do prestanka vegetacijskih procesa u ozimim žitaricama.

U većini istočnih i južnih regija, predviđene prosječne dnevne temperature bit će blizu biološkog minimuma potrebnog za razvoj ozimih žitarica. Uvjeti za vegetaciju u jesenskim usjevima razvijat će se u regijama duž obale Crnog mora, gdje se predviđaju više temperature.

Očekivane oborine tijekom razdoblja povećat će zalihe vlage u tlu u gornjim slojevima tla. Ove oborine će biti zakašnjele za dio usjeva na nekim mjestima u središnjim i južnim regijama, gdje, zbog deficita vlage u tlu, proklijale ozime žitarice nisu niknule. Kao rezultat produžene jesenske suše, velik dio ozimih žitarica je slabo uspostavljen, u početnoj fazi razvoja, a sklopovi imaju neujednačenu gustoću. Početkom prosinca u pšenici će se uočiti sljedeće faze: nicanje, 1–2 i 3 lista. Mali dio sklopova u sjeveroistočnim regijama, gdje vlaga tijekom prve polovice jeseni nije bila ograničavajući čimbenik, nalazi se u fazi busanja (regija Provadije) – odgovarajućoj fazi za prezimljavanje.

Tijekom razdoblja, povoljniji uvjeti za sadnju voćaka pojavit će se u istočnim regijama zemlje.

Izvor NIMH