

# Prosinac – temperature bliske klimatskim normama i oborine od poljoprivrednog značaja

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 07.12.2024 Брой: 12/2024



Početkom prosinca predviđa se znatno sniženje temperatura, što će dovesti do usporavanja i prestanka vegetacije u jesenskim usjevima u većini ratarskih regija u zemlji.

U istočnoj Bugarskoj, gdje će maksimalne vrijednosti doseći 15-16°C, stvorit će se uvjeti za kratkotrajnu aktivaciju vegetacije u jesenskim usjevima, ali značajna promjena u fenološkom stanju ozimih žitarica se ne očekuje.

Početkom mjeseca, kao rezultat dugotrajne jesenske suše, velik dio usjeva pšenice prekinut će vegetaciju nerazvijen, u početnoj fazi rasta. Kod ozimih žitarica prevladavaju faze nicanja i početnog formiranja listova (1-2

lista), što dovodi u pitanje njihovu uspješnu prezimljavanje. Mali dio usjeva u sjeveroistočnim regijama (Targovište, Silistra, Provadija), gdje vlaga tijekom prve polovice jeseni nije bila ograničavajući čimbenik, nalazi se u fazi trećeg lista i na početku busanja (regija Provadija) – odgovarajućoj fazi za prezimljavanje.

Do kraja prvog i tijekom većine dana drugog i trećeg desetljeća, predviđene temperature, bliske klimatskim normama, održavat će poljoprivredne usjeve u stanju mirovanja tijekom prezimljavanja. Tijekom mjeseca predviđaju se minimalne temperature do minus 10°C koje će, u nedostatku snježnog pokrivača i uz dulje zadržavanje, biti kritične za nerazvijene ozime žitarice u fazama nicanja i početnog formiranja listova.

Očekivane oborine u prosincu, oko mjesečne norme, povećat će rezerve tlažne vlage u slojevima tla od 50 i 100 cm.

Oborine koje su pale početkom prosinca premašile su 30-40 l/m<sup>2</sup> na mnogim mjestima u srednjoj i južnoj Bugarskoj (Loveč - 33 l/m<sup>2</sup>, Blagoevgrad - 41 l/m<sup>2</sup>, Sandanski - 42 l/m<sup>2</sup>, Plovdiv - 42 l/m<sup>2</sup>, Haskovo - 41 l/m<sup>2</sup>, Kardžali - 50 l/m<sup>2</sup>, Čirpan - 39 l/m<sup>2</sup>), što je dovelo do prevladavanja deficita vlage za jesenske usjeve u gornjim slojevima tla. Tijekom sljedećeg razdoblja očekuju se daljnje poljoprivredno značajne oborine, kao i povećanje razine rezervi tlažne vlage u slojevima tla od 50 cm i 100 cm.

*Izvor: NIMH*