

Početak ožujka, padaline i snijeg će povećati razinu zaliha vlage u tlu.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.03.2025 Брой: 3/2025



Niske minimalne temperature zabilježene tijekom proteklog sedmodnevnog razdoblja, na pojedinim mjestima u sjeverozapadnoj Bugarskoj i u visokim dolinskim poljima sve do i ispod minus 13-14°C u Vidinu, Kneži, Dragomanu i Kazanlaku, testirale su otpornost na hladnoću nedovoljno razvijenih jesenskih usjeva u uvjetima bez snježnog pokrivača. Vrijednosti ovog reda veličine, kada se zadrže dulje vrijeme, kritične su za prezimljavanje ozimih žitarica u fazi 2-3 lista.

U sjeverozapadnim regijama predstoje terenske inspekcije usjeva na agrometeorološkim postajama Bážovec, Kneža, Kyustendil i Kazanlak radi utvrđivanja mogućih oštećenja od mraza.

Izuzetno niske temperature tijekom posljednjeg tjedna veljače imale su razoran učinak na voćnjake u regiji Ruse–Silistra. Na nekim mjestima temperature su pale na minus 24 stupnja, zbog čega je veliki dio voćnih pupova marellice smrznut, izvještava Nikolay Kolev – predsjednik Saveza dunavskih voćara – Ruse. Oštećenja od mraza uočena su i na trešnjama, breskvama, šljivama, jabukama i kruškama.

Krajem veljače i početkom ožujka temperature će biti ispod klimatskih normi, što će održati stanje mirovanja u jesen zasađenim usjevima. Predviđene minimalne vrijednosti iznad su kritičnih pragova za poljoprivredne usjeve koji prezimljavaju.

Očekivane oborine kiše i snijega povećat će razinu zaliha vlage u tlu u sloju od 50 cm. Kao rezultat ispodprosječnih oborina u siječnju i prvoj polovici veljače, zalihe vlage u tlu u sloju od 100 cm u većem dijelu zemlje nezadovoljavajuće su za ovo doba godine. Predviđena je povećana vjerojatnost stvaranja snježnog pokrivača i poboljšanja uvjeta za prezimljavanje jesen zasađenih usjeva krajem sljedećeg tjedna.

Izvor: NIMH