

U ožujku će temperature biti oko i iznad klimatskih normi, a oborine oko i ispod normi.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 09.03.2025 Брой: 3/2025



Tijekom prve polovice prvog desetljeća, predviđene temperature bit će u rasponima koji će kočiti razvoj poljoprivrednih kultura.

Tijekom druge polovice desetljeća, očekuje se značajan porast temperatura i njihove srednje dnevne vrijednosti će doseći i premašiti biološki minimum potreban za nastavak vegetativnih procesa u ozimim žitaricama.

Predviđene iznadprosječne temperature tijekom drugog desetljeća ožujka potaknut će vegetaciju jesenskih sjetvi. Tijekom tog razdoblja, dio sjetvi pšenice i ječma koji su trenutno u fazi trećeg listaća ući će u fazu busanja.

Očekivane maksimalne temperature do i iznad 20°C također će aktivirati vegetativne procese u većem dijelu višegodišnjih kultura. U voćnim kulturama, faze bubrenja i pucanja pupova odvijat će se kod ranocvatnih koštičavih vrsta (badem, marelica, breskva). U vinogradima u poljskim područjima opažat će se tijek soka.

Uvjeti tijekom razdoblja bit će pogodni za prihranu ozimih kultura mineralnim dušičnim gnojivima, za obavljanje predstjetvene obrade tla i sjetvu ranih jarih kultura (grahorica, grašak, jari ječam).

Početkom drugog desetljeća ožujka ne očekuju se oborine, što će pružiti priliku za pravovremeno provođenje preventivnog prskanja prije cvatnje u voćnjacima fungicidima na bazi bakra protiv uzročnika paleži cvjetova, kovrčavosti lista breskve, pepelnice i drugih patogena.

Tijekom trećeg desetljeća, očekivane temperature, oko i iznad klimatskih normi, održavat će aktivne vegetativne procese u poljoprivrednim kulturama. Krajem mjeseca, u ozimim žitaricama koje su se zbusile u jesen, opažit će se porast koeficijenta busanja.

U ožujku će se u voćnim kulturama odvijati faze bubrenja i pucanja pupova. Krajem mjeseca, kod ranocvatnih vrsta – badema, marelica i breskve – opažit će se faza cvjetnog pupa, a na nekim lokalitetima u južnim regijama – početak cvatnje. U vinogradima u poljskim područjima opažat će se tijek soka.

Tijekom mjeseca, predviđene minimalne temperature, do minus 7°C, predstavljat će rizik za voćne kulture u fazi pupa i cvatnje.

Oborine u ožujku povećat će zalihe vlage u tlu u sloju od 100 cm. Krajem veljače, u većem dijelu zemlje, s izuzetkom nekih mjesta u istočnim regijama, razina zaliha vlage u tlu za ozime žitarice u jednodmetarskom sloju niska je za ovo godišnje doba – u dijelovima Podunavske nizine i južnih regija ispod 70% poljskog vodnog kapaciteta (PVK). Obično, krajem zime, u godinama bez klimatskih anomalija, zalihe vlage u tlu u jednodmetarskom sloju dosežu razine do PVK-a.

U ožujku će pogodniji uvjeti za obavljanje predstjetvene obrade površina namijenjenih sjetvi ranih i srednje ranih jarih kultura nastupiti tijekom druge polovice mjeseca. Sredinom ožujka počinje agrotehnički rok (15.-20.03.) za sjetvu suncokreta u južnoj Bugarskoj, a sredinom trećeg desetljeća (25.03.–5.04.) – u Podunavskoj nizini.

