

Travanj – nestabilno vrijeme i oborine od poljoprivrednog značaja

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.04.2025 Брой: 4/2025



U travnju će se agrometeorološki uvjeti odlikovati povećanom dinamikom. Tijekom većine dana u mjesecu, oni će biti određeni nestabilnim vremenskim prilikama. Očekivane oborine, oko i iznad klimatskih normi, održavat će dobre rezerve vlage u tlu u sloju od 50 cm i uvjete za vegetaciju ozimih žitarica i posijanih jarih usjeva. To se navodi u mjesečnoj prognozi agrometeorologa iz DHMZ-a.

Tijekom prve polovice travnja, vegetacija poljoprivrednih usjeva će se odvijati pri srednjim dnevnim temperaturama oko i ispod klimatskih normi. U prvom desetljeću, pšenica na terenima će ući u fazu izdizanja stabiljike.

Tijekom drugog desetljeća, prognoziraju se negativne minimalne temperature do minus 2-3°C, s povećanim rizikom od oštećenja cvjetova i mladih plodova voćaka. Posljednji proljetni mrazevi očekuju se krajem desetljeća, što treba uzeti u obzir pri kaljenju rasada povrća.

Septorioze u ozimoj pšenici

Povećanje srednjih dnevnih temperatura i ubrzanje razvojnih faza poljoprivrednih usjeva prognozira se krajem drugog i tijekom trećeg desetljeća. Tijekom tog razdoblja, pšenica će proći prijelaz iz faze izdizanja stabiljike u fazu klasanja i metlicanja. Interfazno razdoblje izdizanje stabiljike – klasanje je kritično za zarazu ozimih žitarica septoriozom lisne pjegavosti.



Sastojine pšenice također treba nadzirati na prisutnost štetnika – žitne zlatarice, štitastog smrdljivca, a pri gustoćama iznad ekonomskog praga štetnosti, potreban je pravovremeni tretman.



Škrapa jabuke

Česte oborine tijekom mjeseca stvorit će uvjete za povećanje infekcijske pozadine brojnih gljivičnih bolesti u voćnim kulturama – palež cvjetova (rana smeđa trulež), škrapa, rupičavost lišća, kovrčavost lišća breskve itd. Tijekom prve polovice trećeg desetljeća, prognozira se povećana vjerojatnost tuča. Voćke pogođene tučem treba tretirati fungicidima na bazi bakra pri prvoj prilici kako bi se ograničio rizik od sekundarnih infekcija patogenima.

U travnju će se povoljniji uvjeti za provođenje zaštitnih tretmana prskanjem javiti na početku i kraju drugog desetljeća te tijekom druge polovice trećeg desetljeća.

Početkom trećeg desetljeća, temperatura tla u sloju od 10 cm će doseći pogodne vrijednosti za sjetvu kukuruza, a krajem travnja – također i za toploljubive jare usjeve (pamuk, grah, kikiriki, lubenice, dinje itd.).