

Tijekom drugog desetljeća travnja, predviđa se porast temperatura i poboljšanje uvjeta za razvoj poljoprivrednih kultura.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 11.04.2025 Брой: 4/2025



Neuobičajeno hladno vrijeme tijekom proteklog razdoblja, s minimalnim temperaturama ispod nule i snježnim oborinama, prouzročilo je nepopravljivu štetu voćnim stabljikama i usjevima uljane repice koji su ušli u fazu cvatnje, prema agrometeorolozima. Agronomi će uskoro izvršiti inspekcije gospodarstava kako bi utvrdili štetu na voćnim vrstama i drugim poljoprivrednim usjevima.

Prvi hladni val početkom mjeseca ozbiljno je pogodio proizvođače marelice u regiji Silistra. Unatoč šteti uzrokovanoj zimskim uvjetima u zemlji, sorta "Silistrenska Kompotna" zadržala je svoje cvjetove i očekuje se da

ће родити.

Marelica "Silistrenska Kompotna" glavna je standardna sorta stvorena na eksperimentalnoj stanici u gradu Silistri 1964. godine križanjem mađarske marelice s sortom Krasnoshchekiy. Stablo je umjereno bujno s globularnom krošnjom. Cvatnja je srednje kasna; riječ je o samooprašujućoj sorti.

Tijekom sljedećeg sedmodnevnog razdoblja agrometeorološki uvjeti će se bitno promijeniti. Početkom druge dekade travnja predviđa se porast temperatura i poboljšanje uvjeta za razvoj poljoprivrednih usjeva.

Većinu dana u razdoblju, vegetacija ozimih žitarica odvijat će se umjerenim tempom, pri srednjim dnevnim temperaturama bliskim klimatskim normama za drugu dekadu travnja.

Raširene oborine tijekom prve dekade, koje su u nekim poljskim područjima premašile 40 - 50 l/m², a na mjestima u južnoj Bugarskoj dosegle norme za travanj (Plovdiv - 57 l/m², Haskovo – 58 l/m², Kardzhali – 57 l/m², Chirpan – 56 l/m²), drastično su poboljšale rezerve vlage u tlu, što je od velike važnosti za normalan tijek vegetacijskih procesa u ozimim žitaricama i posijanim proljetnim usjevima.

Krajem razdoblja, u velikom dijelu nasada pšenice uočit će se faza izduživanja stabiljke, tijekom koje biljke povećavaju svoje zahtjeve za vlagom u tlu. U usjevima suncokreta posijanim početkom proljeća prevladavat će faza nicanja.

Predviđene oborine tijekom razdoblja održavat će visok sadržaj vlage u gornjim slojevima tla, što će odgoditi sjetvu suncokreta izvan preporučenih agrotehničkih rokova.

Tijekom druge dekade travnja, ozime žitarice potrebno je nadzirati na prisutnost bolesti i štetnika: pepelnice, septorioze lisnih mrlja, žitne zlatarice, pšeničnog tripsa, štitastog smrdljivca, itd., a ako njihov broj premaši ekonomski prag štetnosti, potreban je pravovremeni tretman.