

Krajem travnja – nestabilno vrijeme s oborinama i uvjetima za stvaranje mraza

Автор(и): Растителна заштита
Дата: 26.04.2025 Брой: 4/2025



Krajem travnja, agrometeorološki uvjeti bit će određeni nestabilnim vremenom i temperaturama blizu klimatskih normi za treću dekadu travnja. Oborine na kraju proteklog razdoblja na mnogim mjestima u zapadnim regijama povećale su zalihe vlage u gornjim slojevima tla. Tijekom prvih dana razdoblja predviđaju se oborine i poboljšanje uvjeta za vegetaciju poljoprivrednih kultura i u istočnim regijama zemlje.

Razvoj ozimih žitarica i posijanih jarih kultura u drugoj polovici razdoblja odvijat će se u uvjetima ispod normalnih termalnih uvjeta. Krajem travnja, stadij formiranja stabljike masovno će prevladavati u pšenici. Početkom svibnja, u ječmu na pojedinim mjestima u poljskim regijama, također će se uočiti početak klasanja. U posijanim sastojinama suncokreta i kukuruza, ovisno o datumima sjetve, odvijat će se nicanje i početno formiranje listova.

Štetnici u kukuruzu



Sivi kukuruzni rilaš (Tanymecus dilaticollis Gyll.)

U početnim fazama vegetacije kukuruza i suncokreta, sastojine treba nadzirati na prisutnost opasnog štetnika – sivog kukuruznog rilaša. Kada gustoća štetnika prijede prag ekonomske štete (EIL), usjeve je potrebno tretirati pri prvom povoljnom vremenskom trenutku jednim od registriranih insekticida (EIL u fazi nicanja: suncokret – 2 jedinice po m²; kukuruz > 2 jedinice po m²).



Plamenjača vinove loze (Plasmopara viticola)

U vinovoj lozi, odvijat će se formiranje 2. – 3. lista, a u krajnjim južnim regijama i pojava cvasti. Tijekom ovog razdoblja, preporučljivo je provesti preventivno prskanje vinograda protiv uzročnika plamenjače i pepelnice.

Mjere zaštite bilja u povrtnim kulturama u travnju

Krajem travnja predviđa se značajan pad minimalnih temperatura i uvjeti za stvaranje mraza, što treba uzeti u obzir pri sadnji povrtnih presadnica u vrtovima.