

U posljednjem tjednu svibnja razvoj poljoprivrednih kultura odvijat će se pri temperaturama ispod klimatskih normi i gospodarski značajnim oborinama.

Автор(и): Растителна заштита
Дата: 26.05.2025 Брой: 5/2025



Tijekom sljedećeg sedmodnevnog razdoblja agrometeorološke će uvjete i dalje određivati nestabilno vrijeme. Tijekom razdoblja predviđaju se oborine agronomskog značaja, kao i poboljšanje zaliha vlage u tlu čak i u dubljim slojevima tla.

Oborine tijekom prvog i drugog desetljeća svibnja bile su neravnomjerno raspoređene. Na mnogim mjestima u južnoj Bugarskoj svibanjske su oborine dosegle i premašile mjesečne norme (Blagoevgrad, Haskovo, Kardzhali,

Elhovo, Chirpan, Karnobat, Burgas). U dijelu južnih regija zalihe vlage u tlu u slojevima od 50 i 100 cm dosegle su razine do i iznad 85% poljskog vodnog kapaciteta (PVK), optimalne za razvoj ozimih žitarica i posijanih jarih usjeva.

Za razliku od južnih regija, na mjestima u sjeveroistočnoj Bugarskoj (agrometeorološka postaja Silistra), kao rezultat ispodprosječnih oborina u travnju i prvoj polovici svibnja, razina zaliha vlage u tlu za ozime žitarice na kraju drugog desetljeća je niska – ispod 65% PVK-a.

Tijekom posljednjeg tjedna svibnja očekuje se značajno poboljšanje zaliha vlage u tlu u sjeveroistočnim regijama, što je od velike važnosti za ozime žitarice, koje imaju visoke zahtjeve za vlagom u tlu.

Tijekom razdoblja, razvoj poljoprivrednih usjeva odvijat će se pri temperaturama ispod klimatskih normi. Do kraja svibnja u ozimih žitarica odvijat će se formiranje i nalijevanje zrna.



Tijekom ovog interfaznog razdoblja, štetu na pšenici uzrokuju ličinke štitastog smrdljivca, što zahtijeva terenski pregled sastojina, a kada gustoća štetočina premaši prag ekonomske štete (2 ličinke/m²), treba provesti tretman pri prvoj prilici.

U suncokretu i kukuruzu odvijat će se formiranje listova.

Krajem svibnja u vinove loze prevladavat će cvatnja cvasti, kritična faza za infekciju plamenjačom i pepelnicom.

Tijekom posljednjeg tjedna svibnja, povećani sadržaj vlage u gornjim slojevima tla ograničit će provedbu sezonskih obrada tla. Tijekom razdoblja očekuje se tuča. Za voćke, povrtne kulture i vinograde pogođene tučom, preporučljivo je provesti tretmane fungicidima koji sadrže bakar kako bi se smanjio rizik od sekundarnih infekcija patogenima.

Izvor: NIMH