


Meteorološki uvjeti tijekom lipnja održavat će povećani infektivni fond gljivičnih patogena na voćnim, povrtnim kulturama i vinovoj lozi.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 06.06.2025 Брой: 6/2025



Većinu dana u lipnju agrometeorološke uvjete će odrediti temperature iznad klimatskih normi i oborine oko i ispod mjesečne norme.

Početkom lipnja predviđa se znatno povećanje temperatura i ubrzanje razvojnih faza poljoprivrednih kultura. Meteorološke uvjete će odrediti temperature iznad normale, koje će održati ubrzane razvojne faze u poljoprivrednim kulturama. Početkom mjeseca očekuju se visoke maksimalne temperature u poljskim područjima, na pojedinim mjestima do 35-36°C, što će, u kombinaciji s niskom vlagom zraka, negativno utjecati

na cvatnju, oplodnju i formiranje reproduktivnih organa u povrtnim kulturama iz ranog poljskog uzgoja (grah, rajčice, paprike, krastavci, tikvice, itd.).



Predviđeno vruće i relativno suho vrijeme tijekom većine dana u razdoblju bit će preduvjet za povećanje populacija grinja.

Zaštitno prskanje bilja protiv bolesti i štetnika treba provoditi tijekom hladnijih sati dana, pri temperaturama ispod 25°C.

Očekivane oborine tijekom druge polovice prve dekade održat će dobre rezerve vlage u slojevima tla od 50 cm i 100 cm.

Značajne oborine krajem svibnja poboljšale su rezerve vlage u tlu i u većini poljskih područja dosegle su razine do i iznad 85% poljskog vodnog kapaciteta. Prisutnost dobrih rezervi vlage u tlu tijekom prve dekade lipnja imat će povoljan učinak na proljetne usjeve i na sjetve pšenice, u kojima će se odvijati nalijevanje zrna i faza mliječne zrelosti. Krajem dekade, u ječmu u nekim od istočnih i južnih regija (Targovište, Provadija, Karnobat), također će se uočiti faza voskaste zrelosti.

Predviđeni toplinski uvjeti iznad normale tijekom druge dekade također će ubrzati procese sazrijevanja u ozimim žitarnim kulturama. Tijekom tog razdoblja, u pšenici u poljskim područjima, odvijat će se prijelaz iz mliječne u

voskastu i punu voskastu zrelost.

Tijekom treće dekade, razvoj poljoprivrednih kultura odvijat će se pri temperaturama blizu klimatskih normi. Krajem dekade, u suncokretu posijanom unutar agrotehničkog roka, uočit će se početak faze cvatnje. U ranim hibridima kukuruza, odvijat će se faze metličanja i cvatnje metlice.



Prašinasta plijesan rijetko se nalazi u uzgojnim objektima. Tipična je za regije koje karakterizira niska vlažnost zraka. Na listovima se formiraju bjelkaste do žute mrlje nepravilnog oblika. Na donjoj strani prekrivene su rijetkim bijelim prevlakom formiranim sporulacijom gljive. U slučajevima jakog napada, mrlje se spajaju i list se sprži. Gljiva napada samo listove biljaka. Optimalni uvjeti za njezin razvoj su temperature iznad 25°C i vlažnost ispod 60%. Posljednjih godina identificirana je nova vrsta koja napada samo stakleničke rajčice i njezini zahtjevi za uvjete okoliša su drugačiji.

Meteorološki uvjeti u lipnju održat će povećanu infektivnu pozadinu gljivičnih patogena: kasnu smeđu trulež u voćnim stablima, plamenjače u povrtnim kulturama i vinovoj lozi. U vinovoj lozi, međufazno razdoblje od cvatnje cvasti do zamatanja ploda (bobice veličine graška) kritično je za zarazu plamenjačom i pepelnicom. Tijekom mjeseca, u vinovoj lozi treba nastaviti tretmane protiv europskog grozdovog moljca, a u voćnjacima – protiv jabukovača, minirajućih moljaca i lisnih uši. Prikladniji uvjeti za provođenje zaštitnog prskanja bilja stvorit će se tijekom prve polovice prve i tijekom većine dana druge dekade.