

Tijekom zadnje dekade lipnja, vegetacija jarih usjeva odvijat će se pri visokim temperaturama i deficitu vlage u tlu.

Автор(и): Растителна заштита

Дата: 24.06.2025 *Брой:* 6/2025



Nakon visokih temperatura sredinom lipnja, koje su u nekim južnim regijama dosegle i premašile 35-36°, nisu zabilježene promjene u agrometeorološkim uvjetima. Očekivane oborine početkom razdoblja bit će bez gospodarskog značaja. Zbog ispodprosječnih oborina i iznadprosječnih temperatura tijekom prvog i drugog desetodnevnog razdoblja lipnja, rezerve vlage u tlu za proljetne usjeve značajno su se smanjile. U nekim južnim regijama, razina rezervi vlage u sloju od 50 cm za kukuruz i suncokret je neuobičajeno niska za početak ljeta – ispod 60% kapaciteta polja.

Većinu dana nadolazećeg razdoblja, vegetacija proljetnih usjeva odvijat će se pri temperaturama oko i iznad klimatskih normi za treće desetodnevno razdoblje lipnja, a u mnogim poljoprivrednim regijama – također s nedostatkom vlage u tlu. Ovo je treća uzastopna godina s izraženom sušom tijekom ljetnih mjeseci, što je štetno za usjeve kukuruza i suncokreta.

Tijekom razdoblja, kod suncokreta će se odvijati formiranje cvata.



Napad sivog kukuruznog žiška posebno je opasan za proljetne usjeve. Znanstvenici s Poljoprivrednog instituta – Shumen proveli su istraživanje polja kukuruza i suncokreta u regijama Veliko Tarnovo, Targovishte, Ruse, Razgrad i Shumen te su utvrdili značajnu štetu od ovog štetnika.

Kod kukuruza će se odvijati formiranje listova. Krajem lipnja, kod ranih hibrida kukuruza primijetit će se početak faze metličanja.

Štetnici kukuruza

Tijekom trećeg desetodnevnog razdoblja lipnja, treba nastaviti s pregledom usjeva kukuruza na prisutnost jednog od najopasnijih štetnika – kukuruznog moljca, a ako broj prekorači ekonomski prag (10 jajnih masa na 100 biljaka), potrebno je primijeniti insekticidno tretiranje protiv ličinki prije nego što se one ubuše u stabljike.

Kukuruzni moljac (*Ostrinia nubilalis* Hübner) – važan gospodarski štetnik kukuruza

Tijekom razdoblja, kod pšenice u poljoprivrednim regijama primijetit će se voštana i puna zrioba. Za usjeve na visokim poljima, odvijat će se mliječna zrioba i prijelaz u voštanu zriobu.

Predviđene su visoke maksimalne temperature i rizik od požara tijekom žetve žitarica.