


Ograničavajući čimbenik za razvoj kasnih poljoprivrednih usjeva u kolovozu ostaje deficit vlage u tlu.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 05.08.2025 Брой: 8/2025



U kolovozu će agrometeorološke uvjete određivati temperature iznad klimatskih normi i oborine – oko i ispod mjesečne norme. Nedostatak vlage u tlu ostat će ograničavajući čimbenik za razvoj kasnih poljoprivrednih usjeva i tijekom kolovoza.

Oborine koje su pale krajem srpnja, nakon produbljene suše, bile su lokalne i nedovoljne da se nadoknadi nedostatak vlage u kasnim poljoprivrednim usjevima. U većini ratarskih regija produktivna vlaga izostaje u slojevima tla od 50 i 100 cm.

Tijekom većine dana u kolovozu, predviđeno relativno suho vrijeme zahtijevat će primjenu povećanih norma navodnjavanja za druge usjeve i kasne hibride kukuruza. Povećane norme navodnjavanja također će biti potrebne za voćke, koje su u procesu formiranja cvjetnih pupova za sljedeću godinu.

Nova generacija hibrida suncokreta iz DAI-a vrlo je intenzivan format za upravljanje prinosom

U kolovozu će, ranije od uobičajenih rokova za zemlju, biti završen razvoj kasnih proljetnih usjeva. Početkom kolovoza, u usjevima suncokreta u južnoj Bugarskoj uočit će se tehnička zrelost (Plovdiv, Haskovo, Sliven, Yambol), a krajem prvog i početkom drugog desetljeća - također u nasadima u velikom dijelu ratarskih regija. Raniji hibridi kukuruza uzgajani u uvjetima navodnjavanja ući će u fazu voštane i pune zrelosti tijekom prvog desetljeća. Srednje kasni hibridi završit će svoj razvoj u trećem desetljeću kolovoza.

Zbog nepovoljnih agrometeoroloških uvjeta u prvoj polovici ljeta, s dugotrajnom sušom i iznimno visokim temperaturama, očekuju se niski prinosi kukuruza i suncokreta.

Trajno visoke temperature u srpnju, koje će se nastaviti u kolovozu, ozbiljno ugrožavaju žetvu proljetnih usjeva.

Jedin oplemenjivački centar za suncokret u zemlji je Poljoprivredni institut Dobrudža, gdje su oplemenjivački naponi usmjereni na stvaranje novih sorti suncokreta otpornih na volovotkinu, plamenjaču i sušu. Jedan od novih hibrida Instituta – “Dara”, pogodan za uzgoj primjenom “Express” tehnologije i otporan na plamenjaču do rase 731 i na volovotkinu do rase G, vrlo dobro se pokazuje u uvjetima suše i visokih temperatura.

U kolovozu se predviđaju maksimalne temperature u rasponu od 35–40°C. Ove vrijednosti imat će negativan utjecaj na cvatnju i oplodnju u povrtnim kulturama iz kasne proizvodnje (krastavci, mahune, tikvice).

Meteorološki uvjeti tijekom mjeseca ograničit će razvoj gljivičnih bolesti, s izuzetkom pepelnice na povrtnim kulturama, voćkama i vinovoj lozi. Očekuje se povećanje populacija grinja. U vinogradima je potrebno pratiti gustoću gusjenica treće generacije europske lozine savijače. Gdje je potrebno, prskanje za zaštitu bilja u kolovozu treba provoditi tijekom hladnijih sati dana (pri temperaturama ispod 25°C), koristeći proizvode s odgovarajućim rokom čekaња do berbe, u skladu s razdobljem zrenja usjeva.

Izvor: NIMH

