

U rujnu se ne očekuju padaline od poljoprivrednog značaja, a uvjeti će omogućiti formiranje dodatnog prinosa od kasnih povrtnih kultura.

Автор(и): Растителна заштита
Дата: 03.09.2025 *Брой:* 9/2025



U rujnu će agrometeorološke uvjete određivati temperature iznad klimatskih normi i oborine oko i ispod mjesečne norme.

Nakon produbljene suše, oborine krajem kolovoza bile su lokalne i samo su na određenim mjestima u središnjim i istočnim regijama navlažile gornji sloj tla. U

većini obradivih regija produktivna vlaga izostaje u slojevima tla od 50 i 100 cm.

Tijekom prvog i drugog desetljeća rujna ne predviđaju se oborine agronomskog značaja, a na mnogim mjestima u obradivim regijama suho i zbijeno tlo otežat će izvođenje duboke oranja i predsjetvene obrade površina predviđenih za sjetvu uljane repice. Vjerojatnost ozbiljnih kašnjenja u sjetvi ove uljarice, koja zahtijeva preciznu agrotehniku, velika je. Agrotehnički rok za sjetvu uljane repice je od kraja kolovoza do kraja drugog desetljeća rujna.



U rujnu će predviđeni iznadprosječni toplinski uvjeti ubrzati završne faze razvoja kasnih poljoprivrednih kultura koje su prevladale štetne učinke dugotrajne ljetne suše. Početkom mjeseca, srednje kasni hibridi kukuruza uzgajani u navodnjavanim uvjetima bit će u fazi voštane i pune zrelosti, dok će kasni hibridi biti u prijelazu iz mliječne u voštanu zrelost.

Većinu dana u mjesecu, predviđeno relativno suho i toplo vrijeme za kraj ljeta i početak jeseni pružit će prikladne uvjete za berbu grožđa. Kao rezultat iznadprosječnih ljetnih temperatura, kasne sorte vinskog grožđa postići će tehnološku zrelost ranije od uobičajenih rokova.

Meteorološki uvjeti u rujnu ograničit će razvoj gljivičnih bolesti, s izuzetkom pepelnice. Za povrtne kulture iz kasne proizvodnje na otvorenom polju, ne treba podcjenjivati tretmane zaštite bilja protiv grinja, kupusnog moljca i pamučnog savijača, koji uzrokuju štetu i pogoršavaju kvalitetu povrtnog uroda.

Tijekom mjeseca, štetna aktivnost velikog dijela štetnika na voćnim kulturama dolazi kraju. Krajem rujna, preporučljivo je pregledati voćnjake krušaka na prisutnost pupoljkaša kruške. Suzbijanje ovog štetnika učinkovito je samo protiv odraslih jedinki na početku jeseni. Kada gustoća štetnika prijede ekonomski prag štetnosti (3 jedinke po stablu), potrebno je provesti tretman.

Kao rezultat iznadprosječnih ljetnih temperatura, dio ranih jesenskih sorti voćaka koje nisu bile pogođene proljetnim mrazevima postići će berbenu zrelost (npr. jabuke: Golden Parmena, Jonathan, Red Delicious, Golden Delicious, Canadian Reinette, itd.).

U rujnu se ne predviđaju kritične minimalne temperature, a uvjeti će omogućiti stvaranje dodatne proizvodnje od kasnih povrtnih kultura osjetljivih na mraz.