

U drugoj polovici studenog bit će uvjeti za obavljanje sezonskih agrotehničkih aktivnosti i sadnju voćaka.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 09.11.2025 Брой: 11/2025



Agrometeorološke uvjete u studenom određivat će temperature bliske i iznad klimatskih normi te oborine oko i ispod mjesečne norme.

Do kraja prve i početka druge dekade studenog, agrometeorološke uvjete određivat će nestabilno vrijeme. Oborine krajem prošlog sedmodnevnog razdoblja i očekivane tijekom sljedećeg dodatno će, izvan agrotehničkih rokova, odgoditi sjetvu pšenice. Dosad je posijano oko polovice planiranih površina.

Oborine u listopadu, koje su dva do tri puta premašile klimatske norme (Sofija, Pleven, Loveč, V. Tarnovo, Razgrad, Ruse, Pazardžik, Stara Zagora, Burgas), održavale su visok sadržaj vlage u gornjim slojevima tla, što je odgodilo predsetvenu obradu i sjetvu ozimih žitarica. Zbog tog objektivnog razloga, u većini dijelova zemlje, s izuzetkom nekih područja u Podunavlju i istočnim regijama, propušteni su agrotehnički rokovi za sjetvu pšenice u listopadu. Značajan dio površina planiranih za ozime žitarice bit će posijan u studenom. Postoji velika vjerojatnost da studenske usjeve do kraja jesenske vegetacije neće moći ući u fazu busanja, prikladnu fazu za prezimljavanje.

Tijekom većine dana u studenom prognoziraju se prosječne dnevne temperature iznad normale, što će održati aktivne vegetacijske procese kod jesenskih usjeva. Krajem mjeseca, ovisno o datumima sjetve, primijetit će se različite faze kod pšenice i ječma. Za usjeve posijane u studenom doći će do nicanja i formiranja listova (1-2-3 lista). U manjem dijelu usjeva pšenice u nekim područjima Podunavlja i istočnih regija (Dobrič, General Toševo, Tervel, Provadija, Karnobat), koji su posijani u ranoj jeseni, primijetit će se početak faze busanja.



Najopasniji štetnik žitarica je obična žitna grbica (Zabrus tenebrioides), koja napada pšenicu, ječam, kukuruz, zob i niz žitnih trava.

U početnim fazama vegetacije pšenice i ječma, usjeve treba pregledati na prisutnost štetnika. Štetu uzrokuju poljski miš, ličinke žitne grbice i žitne muhe, a ako je gustoća iznad EIL-a (Ekonomске razine štete), potrebna je pravovremena zaštita bilja.



U studenom će se u drugoj dekadi stvoriti pogodniji uvjeti za sadnju voćaka i za provođenje fitosanitarnih aktivnosti na voćnim kulturama. Za jezgričave voćne vrste (jabuka, kruška) zahvaćene krastavošću preporučuje se tretiranje 5%-tnom otopinom uree. Za koštičave voćne vrste preporučljivo je prskanje 2%-tnom bordoškom smjesom protiv uzročnika šupljikavosti lišća, rane smeđe truleži i kovrčavosti lista breskve.