

Prosinac – neuobičajeno visoke temperature i lokalizirane oborine

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.12.2025 Брой: 12/2025



Toplo vrijeme za sezonu tijekom većeg dijela studenog i prisutnost vrlo dobrih rezervi vlage u tlu stvorili su uvjete za napredak u razvoju kasno posijanih, nakon agrotehničkih rokova, jesenskih usjeva.

Početkom prosinca, prognozirane temperature iznad normale produžit će vegetacijske procese ozimih žitarica u poljoprivrednim regijama zemlje.

Raširene oborine početkom razdoblja povećat će razinu jesenskih rezervi vlage u sloju tla od 100 cm. Zbog iznadprosječnih oborina u listopadu i studenom, rezerve vlage u tlu u metarskom sloju za ozime žitarice u većini poljoprivrednih regija dosegle su razine do 90% PK (poljskog kapaciteta).

Krajem desetodnevnog razdoblja, agrometeorološke uvjete i dalje će određivati visoke temperature za sezonu. U istočnim regijama, prognozirane su maksimalne vrijednosti iznad 14-15°C, s vjerojatnošću izazivanja nepoželjnog, preranog bubrenja pupoljaka kod nekih ranocvatućih voćnih vrsta, što bi dovelo do smanjenja njihove otpornosti na mraz.

Pogodni uvjeti za završetak jesenskih prskanja voćaka protiv prezimljujućih patogena i štetnika stvorit će se tijekom druge polovice prvog desetodnevnog razdoblja u mjesecu.

Smanjenje temperatura, slabljenje i prestanak vegetacije za pšenicu i ječam očekuju se krajem prvog desetodnevnog razdoblja prosinca.

Tijekom drugog i početka trećeg desetodnevnog razdoblja, prognozirane prosječne dnevne temperature prelazit će klimatske norme, ali će ostati unutar granica koje će održavati ozime žitarice u mirovanju.

Početkom zime, za pšenicu će prevladavati faza trećeg lista. Manji dio usjeva u nekim istočnim i krajnje južnim regijama zemlje, koji su posijani na vrijeme - u listopadu, bit će u fazi busanja, pogodnoj za prezimljavanje. Kasno posijane ozime žitarice, tijekom druge polovice studenog, ući će u zimu nerazvijene, u početnoj fazi formiranja lista (1-2 lista). Razlog značajnih razlika u fenološkom stanju usjeva je odgođena sjetva zbog nepovoljnih uvjeta početkom jeseni – nakon suše i naknadnih iznadprosječnih listopadskih oborina.

Pred kraj prosinca, očekuje se porast temperatura, ali će njihove prosječne dnevne vrijednosti ostati ispod biološkog minimuma potrebnog za nastavak vegetacijskih procesa kod jesenskih usjeva.

Tijekom mjeseca, prognozirane minimalne temperature, do minus 10°C, u uvjetima bez snježnog pokrivača, ako se održe duže vrijeme, bit će kritične za usjeve u početnoj fazi formiranja lista.

Očekivane oborine u prosincu, blizu mjesečne norme, povećat će rezerve vlage u sloju tla od 100 cm do razina bliskih PK (poljskom kapacitetu).