

U veljači, agrometeorološki uvjeti varirat će od zimskih do proljetnih.

*Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.02.2026 Брой: 2/2026*



Nakon blage sezonske vremenske faze krajem siječnja i početkom veljače, agrometeorološki uvjeti ponovno će poprimiti zimski karakter.

Očekivano hlađenje vratit će stanje mirovanja u jesenskim usjevima u južnim i istočnim regijama i usporit će prerano bubrenje pupova kod nekih vrsta koštičavog voća s ranim cvatnjom.

Očekivane snježne oborine formirat će snježni pokrivač koji će pružiti zaštitu kasno sjetvenim ozimim žitaricama od predviđenih niskih minimalnih temperatura – do minus 11-12°C. Ove vrijednosti, u nedostatku snježnog

pokrivača i uz dulje trajanje, kritične su za dio prezimljujućih usjeva u fazi 1-2 lista (Poljoprivredna stanica Nikolaevo).

Tijekom druge polovice prvog i cijelog drugog desetljeća, agrometeorološke će uvjete određivati temperature oko i iznad klimatskih normi. U većini ratarskih regija, osim u područjima južne Bugarske i uz obalu Crnog mora, predviđene prosječne dnevne temperature neće premašiti biološki minimum potreban za nastavak vegetativnih procesa u ozimim žitaricama.

Tijekom trećeg desetljeća veljače predviđen je značajan porast temperatura, a u istočnim i južnim regijama stvorit će se uvjeti za odgođenu vegetaciju u jesenskim usjevima. Do kraja mjeseca, u pšenici će prevladavati faza trećeg lista. Dio usjeva u Podunavskoj ravnici, u krajnjoj istočnoj i jugozapadnoj regiji (Novachene, Silistra, D. Chiflik, Karnobat, Sandanski) prezimljava u fazi busanja.

Očekuje se da će temperature iznad normale tijekom trećeg desetljeća potaknuti prerani razvoj i kod nekih vrsta koštičavog voća s ranim cvatnjom (badem, marelica, breskva) u južnim regijama zemlje.

U veljači će očekivane oborine iznad normale povećati zalihe vlage u tlu u dvometarskom sloju. Zalihe vlage u jednometarskom sloju tla krajem siječnja u većini ratarskih regija, osim u područjima istočne Bugarske (Razgrad, Ts. Brod, D. Chiflik, Sliven, Chirpan), dosegle su razine do poljske vodozapremanosti.

U veljači će se tijekom druge polovice mjeseca stvoriti pogodniji uvjeti za obavljanje rezidbe u vinogradima i voćnjacima, a za prihranu jesenskih usjeva mineralnim dušičnim gnojivima i za obavljanje predviđene obrade tla na površinama namijenjenim sjetvi ranih jarih usjeva (grašak, grahorica, zob, jari ječam) – tijekom trećeg desetljeća.

Rokovi za zabranu gnojiva koja sadrže dušik

Ne zaboravite razdoblja tijekom kojih je primjena dušičnih gnojiva zabranjena za ratarske i trajne kulture, voćnjake, livade i trajne pašnjake prema Zakonu o vodama 2 "Zaštita voda od onečišćenja nitratima iz poljoprivrednih izvora". Ovaj zahtjev posebno je važan za korisnike mjera "Agroekologija i klima" i "Ekološka poljoprivreda", kao i za sve poljoprivrednike čije se zemljište nalazi u područjima osjetljivim na nitratnu onečišćenja. Oni su dužni pridržavati se Nitratne direktive i pravila dobre poljoprivredne prakse.

Prema zahtjevima, postoje određena razdoblja tijekom kojih je rasipanje dušičnih gnojiva zabranjeno:

- Za južnu Bugarsku, to je razdoblje od 1. studenog do 20. veljače i obuhvaća okruge Blagoevgrad, Burgas, Kardzhali, Pazardzhik, Plovdiv, Sliven, Smolyan, Stara Zagora, Haskovo, Yambol, grad Sofiju, Sofijsku oblast, Pernik i Kyustendil;
- Za sjevernu Bugarsku, razdoblje je od 1. studenog do 25. veljače i uključuje okruge Varna, Vratsa, Veliko Tarnovo, Vidin, Gabrovo, Dobrich, Lovech, Montana, Pleven, Razgrad, Ruse, Silistra, Targovishte i Shumen;
- Od 1. studenog do 5. veljače nije dopuštena gnojidba jednogodišnjih usjeva sjetih u jesen;
- Od 1. studenog do 25. veljače – na slobodnim površinama pripremljenim za sjetvu i sadnju usjeva;
- Prilikom osnivanja novih voćnjaka, dušična se gnojiva ne primjenjuju od 15. studenog do 25. veljače.

Godišnja norma za dušična gnojiva, uključujući organska i mineralna (anorganska), iznosi do 17 kilograma aktivne tvari po dekaru. Poljoprivrednici su dužni voditi evidenciju o gnojidbi u koju se bilježi doza gnojidbe, naziv, vrsta i količina primijenjenih gnojiva, kao i rezultati prethodnih analiza tla i preporuke stručnjaka za gnojidbu.