

Početkom ožujka, visoki sadržaj vlage u gornjim slojevima tla otežat će sjetvu ranih proljetnih usjeva.

Автор(и): Растителна заштита
Дата: 02.03.2026 Брой: 3/2026



Tijekom prvog desetljeća ožujka, agrometeorološki uvjeti bit će određeni iznadprosječnim temperaturama. Predviđeno toplo vrijeme na početku mjeseca, s maksimalnim vrijednostima iznad 15-16°C, aktivirat će vegetativne procese u jesenskim usjevima i voćnim kulturama u poljskim regijama zemlje. Tijekom tog razdoblja, treći listni stadij prevladavat će u usjevima pšenice u sjeverozapadnim regijama, dok će u istočnim i južnim regijama dominirati stadij busanja.

U voćnim kulturama, bez opasnosti od kritičnih minimalnih temperatura, u ranocvjetnim koštuničavim vrstama u južnim regijama dogodit će se stadiji bubrenja pupova i pucanja pupova.

Tijekom razdoblja ne očekuju se značajne oborine. Zbog iznadprosječnih oborina u veljači, zalihe vlage u tlu u sloju od 100 cm u većini poljskih regija dosegle su razine do poljske vodnozapreminske vrijednosti. U dijelovima južnih regija, gdje su oborine premašile mjesečne norme dva do tri puta (Sliven -111 l/m², Stara Zagora - 130 l/m², Haskovo - 155 l/m², Kardzhali - 150 l/m², Elhovo - 121 l/m², Chirpan - 118 l/m²), usjevi ozimih žitarica su previše vlažni.



I u nadolazećem razdoblju, visok sadržaj vlage u gornjim slojevima tla na mnogim mjestima u južnoj Bugarskoj otežavat će prihranu jesenskih usjeva dušičnim mineralnim gnojivima i provođenje predsjetvene obrade tla na površinama namijenjenim sjetvi ranih proljetnih usjeva (grahorica, grašak, jarni ječam).

Nakon očekivanog kratkog hlađenja na kraju prvog desetljeća, za većinu dana drugog desetljeća predviđene su prosječne dnevne temperature iznad biološkog minimuma potrebnog za vegetaciju ozimih žitarica.



Tijekom trećeg desetljeća ožujka, razvoj poljoprivrednih kultura nastavit će se pod temperaturama bliskim klimatskim normama. Do kraja mjeseca, u pšenici će prevladavati stadij busanja. U ozimim žitaricama posijanima unutar agrotehničkog roka, uočit će se povećanje koeficijenta busanja.

Tijekom ožujka, u voćnim kulturama dogodit će se sljedeće faze: bubrenje, pucanje voćnih pupova, formiranje pupova i cvatnja u ranocvjetnim koštuničavim vrstama (badem, marelica, breskva, trešnja). Predviđene minimalne temperature tijekom mjeseca, do minus 7°C, bit će kritične za voćke koje su ušle u faze formiranja pupova i cvatnje.

Očekivane oborine u ožujku, bliske mjesečnim normama, održavat će dobre zalihe vlage u tlu za ozime usjeve žitarica. Zbog iznadprosječnih oborina u veljači (Shumen -103 l/m², Razgrad -104 l/m², Ruse - 103 l/m², Silistra - 100 l/m², Dobrich - 98 l/m², Haskovo - 155 l/m², Kardzhali - 151 l/m², Sliven -111 l/m², Stara Zagora - 130 l/m², Elhovo - 123 l/m², Chirpan - 119 l/m²), zalihe vlage u sloju tla od 100 cm za jesenske usjeve dosegle su razine bliske poljskoj vodnozapreminskoj vrijednosti.

Sredinom ožujka počinje agrotehnički rok (15.-20.03.) za sjetvu suncokreta u južnoj Bugarskoj, a sredinom trećeg desetljeća (25.03.-05.04.) – u Podunavlju.