

# 'Krajem svibnja i početkom lipnja – nestabilno vrijeme s visokim rizikom od tuče i uvjetima za razvoj bolesti na poljoprivrednim kulturama'

*Автор(и):* Растителна заштита  
*Дата:* 02.06.2026 *Брой:* 6/2026



Tijekom nadolazećeg sedmodnevnog razdoblja (29. svibnja – 4. lipnja 2026.), agrometeorološki uvjeti bit će određeni nestabilnim vremenom. Razvoj poljoprivrednih kultura odvijat će se pri temperaturama blizu klimatske norme i uz optimalne rezerve vlage u tlu, kao rezultat značajnih oborina u svibnju, koje su premašile mjesečnu normu u većini poljoprivrednih regija.

Tijekom ovog razdoblja, ozime žitarice prolazit će kroz faze nalijevanja zrna i mliječne zrelosti, uglavnom u istočnim i južnim regijama – Sandanski, Targovište, Silistra, Provadija i Karnobat.



*Žitne stjenice (Eurygaster integriceps Put.) oštećuju stabljike žitarica i zrna, što rezultira smanjenom količinom i lošijom kvalitetom. Oštećena zrna sadrže manju količinu glutena, a dobiveno brašno ima loša svojstva za pečenje, što dovodi do gustog kruha. <https://www.plant-protection.com/bg/article/2277?lang=bg>*

Krajem svibnja i početkom lipnja, štetu na pšenici uzrokuju ličinke žitne stjenice, što zahtijeva pregled usjeva. Ako gustoća štetnika premaši ekonomski prag (2 ličinke/m<sup>2</sup>), tretman treba provesti pri prvoj prilici.

---

### **VIXERAN: Prirodna snaga i održivi prinos kukuruza**

---

Tijekom razdoblja, kod kukuruza i suncokreta odvijat će se formiranje listova. U nasadima suncokreta posijanim u agrotehničkom roku u najjužnijim regijama, također će se primijetiti početak faze formiranja cvata.



*Pepelnica Oidium tuckeri. Visoka atmosferska vlažnost i uporno zagrijavanje vremena tijekom mjeseca preduvjeti su za razvoj bolesti. <https://www.plant-protection.com/article/1802?lang=bg>*

Kod vinove loze doći će do cvatnje grozdova – kritična faza za infekciju pepelnicom.



*Simptomi fuzarioze klasa pšenice. <https://www.plant-protection.com/article/1780?lang=bg>*

Česte oborine tijekom razdoblja stvorit će uvjete za razvoj bolesti: fuzarioza klasa pšenice, kasna smeđa trulež na zrelih plodovima trešnje i siva plijesan na jagodama. Postoji visok rizik od tuče i polijeganja usjeva pšenice.