Растителна защита

електронно списание за растителна защита
семена, торове и земеделие
ISSN 2815-522X

Bokser Evo: čist početak za žitarice

syngenta, България

Datum 21.09.2026 | **Broj** 9/2026 | **ISSN** 2815-522X | **Jezik** HR
www.plant-protection.com/article/2470?lang=hr



Boxer Evo novi je herbicid tvrtke Syngenta, razvijen kao odgovor na jedan od glavnih izazova u usjevima žitarica: zakorovljenost. Proizvod kombinira dvije aktivne tvari, prosulfokarb i diflufenikan, sa snažnom sinergijom među njima, što osigurava pouzdano i širokospektralno suzbijanje korova.

Primijenjen prije nicanja ili rano nakon nicanja (u jesen), Boxer Evo uklanja konkurenciju korova od samog početka i daje pšenici, ječmu, raži i tritikaleu čist start i dobre uvjete za razvoj.

Ključne prednosti:

Visoko učinkovito rano suzbijanje širokog spektra travnih i širokolisnih korova

Izvrstan nadzor teških travnih korova: ljulj, divlja zob, stoklasa, muharičica, jednogodišnja livadarka (prije i nakon nicanja)

Pouzdana učinkovitost protiv širokolisnih korova: poljska veronika, divlja maćuhica, broćika, kamilica, raznolačak i drugi

Dva različita načina djelovanja za veću učinkovitost i održivo suzbijanje

Izvrstan partner za upravljanje rezistentnošću, uključujući i populacije koje je teško kontrolirati

Boxer Evo je temelj na kojem proizvođači mogu graditi.

Način djelovanja

Boxer Evo kombinira dvije aktivne tvari s dva različita načina djelovanja:

Prosulfokarb inhibira staničnu diobu te nicanje i razvoj korova. Apsorbira se uglavnom putem korijenovog sustava biljaka, pri čemu se glavni učinak postiže unosom kroz hipokotil. Iz tla se usvaja putem korijena.

Diflufenikan remeti sintezu karotenoida, uzrokujući razgradnju klorofila.

Kombinacija dvaju različitih načina djelovanja osigurava veću učinkovitost i ključna je za održivo upravljanje rezistentnošću.

Integrirana tehnologija za upravljanje rezistentnim oblicima ljulja

Suzbijanje u dva ključna trenutka u razvoju usjeva žitarica:

Jesen, Boxer Evo: 300 ml/ha, prije nicanja ili nakon nicanja (1.-2. list)

Proljeće, Avoxa: 160-180 ml/ha

Prednosti jesenskog tretmana: uklanjanje korova koji klijaju i niču u jesen, smanjenje banke sjemena korova u tlu, stvaranje uvjeta za čist start i dobar razvoj biljaka usjeva.

Prednosti proljetnog tretmana: uklanjanje konkurencije korova koji niču, smanjenje negativnog učinka konkurencije, očuvanje potencijala prinosa po jedinici površine.

Dva različita načina djelovanja u dva ključna trenutka znače veću učinkovitost i smanjenu gustoću zakorovljenosti.

Registriran za: pšenicu, ječam, raž, tritikale

Vrijeme primjene prema BBCH

Primjena na tlo ili rana vegetativna primjena u BBCH 00-09 (prije nicanja) ili BBCH 10-13 (1.-2. list), doza 300 ml/ha.

Dokazana učinkovitost na pokusnim poljima Syngenta Bulgaria

Rezultati primjene na tlo i rane vegetativne primjene u sezoni 2024.-2025. u južnoj središnjoj Bugarskoj (selo Otets Kirilovo) i sjeveroistočnoj Bugarskoj (grad Popovo), s jasno izraženom učinkovitošću u usporedbi s netretiranom kontrolom.

Preporuke za primjenu

Primjena na tlo ili rana vegetativna (1.-2. list)

Doza primjene: **300 ml/ha**

Količina vode: **16-30 l/ha**

Saznajte više o **Boxer Evo** tvrtke Syngenta!