

U listopadu: Kakvi će biti agrometeorološki uvjeti i kada su optimalni datumi sjetve

Растителна Заштита

Datum 09.10.2026 | Broj 10/2026 | ISSN 2815-522X | Jezik HR

www.plant-protection.com/article/2478?lang=hr



Tijekom prvih deset dana listopada, agrometeorološki uvjeti bit će određeni nestabilnim vremenom i prosječnim dnevnim temperaturama oko i ispod klimatskih normi. Prognozirano hladno i vlažno vrijeme većinom dana ovog razdoblja bit će preduvjet za razvoj patogena - kasne smeđe truleži na plodovima jesenskih sorti voćaka (*Monilia fructigena*), sive plijesni (*Botrytis cinerea*) na neobranom grožđu. Očekuju se masovni mrazovi krajem desetodnevnog razdoblja, što zahtijeva pravovremenu berbu povrtnih kultura podložnih mrazu.



*Kasna smeđa trulež na plodovima jesenskih sorti voćaka (*Monilia fructigena*)*

Tijekom prvih deset dana listopada prognoziraju se oborine, poboljšanje stanja gornjih slojeva tla i uvjeta za obavljanje sezonske obrade tla. Suša krajem ljeta otežala je obavljanje predsetvene obrade površina namijenjenih sjetvi ozimih kultura. Zbog toga su pušteni agrotehnički rokovi u rujnu za sjetvu ozime uljane repice.



Listopad je optimalno vrijeme za sjetvu ozimih žitarica. Tijekom prvih deset dana je agrotehnički rok za sjetvu pšenice u sjevernoj Bugarskoj, od 15. do 25. listopada - u južnoj Bugarskoj, a krajem mjeseca – u područjima uz obalu Crnog mora.

Agrometeorološki uvjeti u razdoblju od 9. do 16. listopada bit će dinamični. Na početku ovog sedmodnevnog razdoblja prognozirane prosječne dnevne temperature bit će iznad normale, a tijekom ostatka bit će unutar klimatskih normi. Na početku razdoblja prognoziraju se lokalne i slabe oborine u zapadnoj Bugarskoj, a sredinom također u poljoprivrednim područjima srednje i istočne Bugarske. Mjestimično će količine biti značajne, što će poboljšati vlaženje gornjih slojeva tla. Ne očekuju se uvjeti za nastanak mrazeva.

Osim u nekim područjima zapadne Bugarske, tijekom prve polovice prognozirano razdoblje agrometeorološki uvjeti bit će povoljni za završnu berbu vinograda i voćnjaka, čišćenje površina od okopavinskih kultura i kasnog povrća, kao i za podizanje krme i šećerne repe, koje su u fazi tehnološke zrelosti. Uvjeti će biti povoljni za obavljanje agrotehničkih aktivnosti povezanih sa sjetvom ozimih žitarica. U slučaju jake zakorovljenosti površina, preporučljivo je obaviti jesensku primjenu herbicida.



Do sredine razdoblja agrometeorološki uvjeti omogućit će primjenu mineralnih i organskih gnojiva, kao i predzimsku sadnju luka za mladi luk, ozimog češnjaka, salate i špinata.

Kiše koje se očekuju tijekom druge polovice prognozirano razdoblje znatno će ograničiti mogućnosti za obavljanje poljoprivrednih aktivnosti.

Tijekom drugog i trećeg desetodnevnog razdoblja agrometeorološki uvjeti bit će određeni temperaturama bliskim uobičajenima. Očekivane oborine tijekom prve polovice drugog desetodnevnog razdoblja, na početku trećeg i krajem mjeseca, poboljšat će rezerve vlage u tlu u sloju od 50 cm i uvjete za tijek početnih faza vegetacije posijanih ozimih kultura. Krajem listopada, kod pšenice i ječma, ovisno o rokovima sjetve, promatrat će se faze nicanja i formiranja 1-2-3 lista.



U listopadu jesenske kulture napadaju štetnici. U ozimim žitaricama potrebno je pratiti prisutnost poljske voluharice, žitnog kornjaša i žitnih muha. Kada brojnost štetnika prijeđe gospodarski prag štetnosti (GPT), potrebna je pravovremena zaštita. Za poljsku voluharicu GPT iznosi 2 aktivne kolonije po deka-gramu, za običnog žitnog kornjaša - 3 ličinke/m².