

Tijekom prve polovice svibnja, bit će povoljni uvjeti za razvoj zarazne pozadine brojnih gljivičnih bolesti u poljoprivrednim usjevima.

Автор(и): Растителна заштита

Дата: 03.05.2017 Брой: 5/2017



Česte, lokalno intenzivne, oborine početkom svibnja bit će preduvjet za povećanje infekcijskog pritiska niza gljivičnih bolesti: fuzarioze i rđe (žute, smeđe) u pšenici i ječmu; plamenjače u povrtnim kulturama; parše i rupičavosti u voćnim stabljikama; plamenjače i pepelnice u vinovoj lozi.

Tijekom prvog desetljeća svibnja, agrometeorološki uvjeti bit će određeni nestabilnim vremenom s čestim pljuskovima, što će u mnogim dijelovima zemlje ometati provedbu sezonskih agrotehničkih aktivnosti – završetak sjetve kukuruza, predsetvena obrada tla i sjetva kasnih termofilnih jarih usjeva – graha, pamuka, kikirikija, lubenica, dinja itd.

Tijekom tog razdoblja, razvoj jesensko-sijanih sastojina i posijanih jarih usjeva odvijat će se pri srednjim dnevnim temperaturama bliskim klimatskim normama i uz prisutnost dobrih rezervi vlage u tlu u sloju od 50 cm, iznad 85% poljskog vodnog kapaciteta (PVK). Tijekom desetljeća, u pšenici i ječmu u poljskim regijama zemlje, masovno će se uočavati faza klasanja, a na pojedinim mjestima u južnoj Bugarskoj – početak cvjetanja.

Krajem prvog i početkom drugog desetljeća, predviđa se porast temperatura i ubrzanje vegetacije u poljoprivrednim kulturama. Do sredine svibnja, u ozimim žitaricama dogodit će se cvjetanje i oplodnja, a u kukuruzu i suncokretu – formiranje listova. U ranim jarim usjevima (grahorica, grašak) uočit će se pupanje i cvjetanje.

U voćnim kulturama koje nisu pogođene travanjskim mrazevima, dogodit će se formiranje i povećanje zametaka ploda. U vinovoj lozi uočit će se nicanje cvasti.

Česte, lokalno intenzivne, oborine početkom svibnja bit će preduvjet za povećanje infekcijskog pritiska niza gljivičnih bolesti: fuzarioze i rđe (žute, smeđe) u pšenici i ječmu; plamenjače u povrtnim kulturama; parše i rupičavosti u voćnim stabiljima; plamenjače i pepelnice u vinovoj lozi. Prikladniji uvjeti za provođenje tretmana zaštite bilja nastupit će krajem prvog i u prvoj polovici drugog desetljeća.

Do sredine svibnja ne predviđaju se kritične minimalne temperature za poljoprivredne kulture. Tijekom prvog desetljeća očekuje se povećana vjerojatnost tuče. U slučaju oštećenja od tuče, preporučljivo je da se pogođeni usjevi prilikom prve mogućnosti tretiraju fungicidima koji sadrže bakar radi bržeg zacjeljivanja rana i smanjenja rizika od sekundarnih infekcija.

Izvor: NIMH-BAS