

U lipnju će meteorološki uvjeti biti povoljni za razvoj gljivičnih bolesti.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 05.06.2017 Брой: 6/2017



U lipnju će meteorološki uvjeti biti povoljni za razvoj niza gljivičnih bolesti: plamenjače na vinovoj lozi i povrtnim kulturama, kasne smeđe truleži na plodovima kasnih sorti trešanja, pucanja plodova u voćnjacima, itd. Prikladniji uvjeti za provođenje tretmana zaštite bilja nastupit će početkom prvog, tijekom druge polovice drugog te većinom dana treće dekade mjeseca. Tijekom mjeseca, predviđene maksimalne temperature, oko 34-35°C, imat će negativan utjecaj na cvatnju i oplodnju povrtnih kultura.

Početkom lipnja razvoj poljoprivrednih kultura odvijat će se ubrzanim tempom, uz temperature iznad normale i, u većem dijelu zemlje, uz dobre i vrlo dobre rezerve vlage u tlu kao rezultat obilnih oborina tijekom treće dekade svibnja (Vraca – 57 l/m², Loveč – 41 l/m², Pleven - 106 l/m², Veliko Trnovo - 74 l/m², Svištov – 68 l/m², Ruse – 51 l/m², Silistra – 48 l/m²). Iznimke će se uočiti samo na pojedinačnim lokacijama u južnim i jugoistočnim regijama, gdje oborine nisu imale poseban gospodarski značaj, ispod 10 l/m².

Sredinom prve dekade predviđa se pad i normalizacija temperatura te promjena agrometeoroloških uvjeta. Očekivane oborine do kraja prve dekade održavat će rezerve vlage u tlu unutar optimalnih raspona za vegetaciju jarih kultura. Također će imati povoljan učinak na ozime žitarice na višim poljima, gdje će se odvijati nalijevanje zrna. U pšenici u nizinskim regijama zemlje uočiti će se faza mliječne zrelosti. U ječmu će se odvijati prijelaz iz mliječne u voštanu i voštanu zrelost. Tijekom prve dekade uljana repica će ući u fazu zrenja. Tijekom tog razdoblja predviđa se povećana vjerojatnost tuče, s opasnošću od poleganja usjeva i dodatnih oštećenja poljoprivrednih kultura. U slučaju oštećenja od tuče, preporuča se da se zahvaćene povrtna i voćna kultura prilikom prve mogućnosti tretiraju odgovarajućim (bakar sadržavajućim) fungicidima.

Tijekom većine dana druge i treće dekade, razvoj poljoprivrednih kultura odvijat će se uz temperature blizu normale. Početkom druge dekade, na poljskim površinama, ječam će uglavnom biti u fazi masovnog zrenja. Krajem dekade, pšenica će uglavnom biti u fazi voštane zrelosti.

Do kraja lipnja, dio jarih kultura ući će u reproduktivne faze svog razvoja: u suncokretu će se uočiti početak cvatnje, a kod ranih hibrida kukuruza – metličanje i cvatnja metlice. Tijekom mjeseca, predviđene maksimalne temperature, oko 34-35°C, imat će negativan utjecaj na cvatnju i oplodnju povrtnih kultura.

Izvor: NIMH - BAN