

Mjere zaštite bilja u lipnju za vinograde

Автор(и): гл.експерт Татяна Величкова, Дирекция "Оценка на риска по хранителната верига", ЦОРХВ

Дата: 13.06.2017 Брой: 6/2017



Tijekom ovog razdoblja, vinova loza je od fenofaze "puna cvatnja" do fenofaze "boba veličine graška" - "zatvaranje grozda".

Glavni štetnici za ovo razdoblje

Plamenjača vinove loze *Plasmopara viticola*

Prašnjava pepelnica *Oidium tuckeri*

Siva plijesan *Botrytis cinerea*

Grozdiv moljac *Lobesia botrana*

Vinova štitasta uš *Pulvinaria vitis*

Vinova žuta grinja *Schizotetranychus viticola*

Siva plijesan

U fenofazi "*puna cvatnja*" na cvjetovima i cvjetnim stapkama nastaju smeđe mrlje prekrivene sporulacijom patogena. Ovi simptomi poznati su kao rana siva plijesan.

Strategija suzbijanja: U kišnom i toplom vremenu, neposredno nakon cvatnje, pri pojavi prvih bobica i pri zatvaranju grozda, provodi se tretiranje jednim od registriranih sredstava za zaštitu bilja.

Odobrena sredstva za zaštitu bilja: arvak 50 WG - 100-150 g/ha; geox WG - 100 g/ha; driza WG - 100-150 g/ha; cabrio top – 0.2%; cantus - 100 g/ha; mevalon - 160-400 ml/ha; proletus 50 WG - 120 g/ha; rebut WG - 100-150 g/ha; sabueso - 100-150 g/ha; synpro - 150 ml/ha; switch 62.5 WG - 0.08%; thiram 80 WG – 0.4%; top plus 70 WP – 0.1%; topsin M 70 WDG – 0.1%; folder 80 WG - 150 g/ha; follow 80 WG / friller 80 WG / flowet 80 WG - 187.5 g/ha; folpan 80 WDG - 0.1 % + ardent 50 SC - 0.015 %; shavit F 72 WDG – 0.2%.

Grozdiv moljac

U lipnju leti drugi naraštaj leptira štetnika. Oni polažu jaja na bobice veličine graška (prve bobice). Ličinke oštećuju prve bobice glodanjem i izjedanjem unutrašnjosti bobica zajedno sa sjemenkama. Oštećene bobice slabo su povezane svilenim nitima. Jedna ličinka ošteti od 7 do 24 bobica.

Strategija suzbijanja: Tretmane treba provoditi pri **ETL**: za stolne sorte *6-7 ličinki na 100 prvih bobica*, a za vinarske sorte *11-12 ličinki na 100 prvih bobica*.

Odobrena sredstva za zaštitu bilja: aficar 100 EC – 40 ml/ha; dascor 440 - 50 ml/ha; decis 100 EC - 12.5-17.5 ml/ha; dipel 2 X - 0.1 %; dukat 25 EC - 70 ml/ha; efcimetrin 10 EC / cyper 10 - 40 ml/ha; karate zeon 5 CS – 0.02%; coragen 20 SC - 18 ml/ha; luzindo 40 WG - 0.025 kg/ha; mageos - 10 g/ha; maltoato - 40-60 ml/ha; nexcid 015 CS - 0.03 %; nurelle D / chlorsirin 550 EC / samba - 60 ml/ha; runner 240 SC - 0.04 %; rapax - 75-100 ml/ha; reldan 40 EC - 0.12 %; sineis 480 SC - 4-18 ml/ha; sumi alpha 5 EC / sumicidin 5 EC - 0.025 %; forey 48 B - 0.15 %; fury 10 EC - 0.0125 %; ciklon 10 EC - 40 ml/ha; cyperfor 100 EC - 40 ml/ha; citrin max /

cyperkyl 500 EC / cypert 500 EC / poli 500 EC - 6 ml/ha; sherpa 100 EW / aficar 100 / cyperfor 100 EW / ciklon 100 EW - 25 ml/ha; sherpa 100 EC - 40 ml/ha.