

Vrijeme za žetvu

Автор(и): Растителна заштита
Дата: 03.07.2017 Број: 7/2017



Nakon lipanjskih vrućina, tijekom prvih deset dana srpnja očekuje se normalizacija toplinskih uvjeta. Predviđene oborine na početku mjeseca poboljšat će uvjete za vegetaciju jarih usjeva, od kojih će velik dio ući u reproduktivne faze svog razvoja. Tijekom mjeseca, predviđene iznimno visoke maksimalne temperature, u rasponu od 38-42°C, u kombinaciji s niskom vlagom zraka imat će negativan utjecaj na cvatnju i oplodnju kod suncokreta, kukuruza i povrtnih kultura (rajčice, krastavci, paprike, tikvice).

U srpnju će se razvoj poljoprivrednih kultura odvijati pri temperaturama oko i iznad klimatskih normi, a na mnogim mjestima u nizinskim područjima – u uvjetima manjka vlage u tlu. **Predviđeno suho vrijeme tijekom većine dana u mjesecu zahtijevat će primjenu odgovarajućeg režima navodnjavanja za jare usjeve, s**

povećanim normama navodnjavanja u sjeverozapadnim i južnim regijama zemlje, gdje su zalihe vlage u tlu u sloju od 50 cm na početku ljeta oskudne - ispod 50-55% poljskog vodnog kapaciteta (PVK).

Nakon lipanjskih vrućina, tijekom prvih deset dana srpnja očekuje se normalizacija toplinskih uvjeta. Predviđene oborine na početku mjeseca poboljšat će uvjete za vegetaciju jarih usjeva, od kojih će velik dio ući u reproduktivne faze svog razvoja.

Tijekom prvog i drugog desetljeća, u kukuruзу će se javiti sljedeće faze: metličanje, cvatnja metlice i svilanje. Tijekom trećeg desetljeća, neki od ranih hibrida kukuruza na poljskim površinama ući će u fazu mliječne zrelosti.

U srpnju će suncokret proći kroz cvatnju, oplodnju i punjenje zrna. Krajem mjeseca, u nekim sastojinama u Podunavlju te u krajnje istočnim i južnim regijama, primijetit će se početak faze zrenja. Tijekom trećeg desetljeća, poljski grah u nizinskim područjima završit će svoj razvoj.

Tijekom mjeseca, predviđene iznimno visoke maksimalne temperature, u rasponu od 38-42°C, u kombinaciji s niskom vlagom zraka imat će negativan utjecaj na cvatnju i oplodnju kod suncokreta, kukuruza i povrtnih kultura (rajčice, krastavci, paprike, tikvice).

Agrometeorološki uvjeti u srpnju ograničit će razvoj brojnih gljivičnih bolesti u poljoprivrednim kulturama, s izuzetkom pepelnice. Suho i toplo vrijeme bit će preduvjet za povećanje populacije određenih štetnika - grinja. U voćnim kulturama ne treba podcjenjivati štetnu aktivnost druge generacije voćnih moljaca. Tijekom mjeseca, tretmane za zaštitu bilja treba provoditi tijekom hladnijih sati dana. Za srpanj se predviđa povećana vjerojatnost tuče. U slučaju oštećenja od tuče, preporučljivo je da se pogođene voćne i povrtne kulture tretiraju što je prije moguće odgovarajućim fungicidima koji sadrže bakar.

Povoljniji uvjeti za provođenje najvažnije sezone aktivnosti – žetve pšenice – nastupit će sredinom prvog, u prvoj polovici drugog, te tijekom većine dana trećeg desetljeća. Očekuje se dobar prinos zrna.

Izvor: DHMZ-BAS