

Mjere zaštite bilja u slučaju štete od tuče u voćarskim usjevima

Автор(и): Растителна заштита
Дата: 06.07.2017 Брой: 7/2017



Tijekom tuče, lišće se pokida, a izbojci, grančice i grane se ozlijede. Šteta je posebno opasna u razdoblju povećanja i sazrijevanja ploda. Opseg štete ovisi o intenzitetu i trajanju tuče, te naravno o zahvaćenom usjevu.

Prva mjera nakon tuče je odmah očistiti grane od ledene mase i, pri prvoj prilici, tretirati ih prikladnim fungicidima koji sadrže bakar. Sva stabla moraju biti tretirana, bez obzira na to jesu li rodna ili mlada. Rane uzrokovane tučom glavni su preduvjet za infekciju gljivičnim i bakterijskim bolestima.

Preporučljivo je da se plodovi oboreni tučom brzo pokupe i iskoriste prema njihovoj prikladnosti, ali ni u kojem slučaju ne smiju biti ostavljeni da trunu na površini tla. Rane na stablima su vrlo opasne jer, ako zahvate dublje

slojeve, teško zacjeljuju. U slučaju veće tuče, dolazi do razderotina kore, koje su ponekad vrlo opsežne, a teško pogođena stabla ugibaju. Stoga, nakon tuče, rane treba zagladiti, teško oštećene dijelove ukloniti, a površine premazati bojom na bazi ulja. Voćke imaju sposobnost brzog oporavka; stoga se nakon mehaničkog oštećenja ostavljaju grane s manjim ozljedama, a ako se ne oporave, izrežu se tijekom zimskog rezidbe.

Nakon tuče potrebno je nastaviti zaštitu bilja od bolesti i štetnika u voćkama, kako bi se spriječile dodatne štete od kraste, jabukovača, lisnih uši i drugih.